

4 厘米,干后淡褐色,有鳞秕,果柄两端膨大,长 7—15 毫米,可以区别。

9. 土楠属——*Endiandra* R. Br.

R. Br. Prodr. Nov. Holl. 402. 1810; Baillon, Hist. Pl. 2: 474. 1870; Endl. Gen. Pl. 318. 1837; Meissn. Gen. 325 (238). 1841; et in DC. Prodr. 15 (1): 78. 1864; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 3: 154. 1862; Pax in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(2): 120. 1889.——*Dicotyodaphne* Bl. in Mus. Bot. Lugd. Bat. 1: 270. 1851.——*Brassiodendron* Allen in Journ. Arn. Arb. 23: 153. 1942.

乔木。芽小,有鳞片。叶互生,羽状脉,细脉常呈蜂巢状小窝穴。圆锥花序腋生,生于新枝基部,具梗,多花,或几退化成一聚伞花序。花两性,细小。花被筒极短,近于无或为钟形;花被裂片 6,近相等或外轮 3 枚稍大。能育雄蕊 3,属于第三轮,花药稍增厚,无柄,在中部或在顶端之下方向有外向的 2 药室,第一、二轮 6 个雄蕊不存在或不发育而退化成腺体,有时腺体连成肉质的环。退化雄蕊位于最内轮,不存在,或稀为 3。子房无柄,花柱短,柱头小。果长圆形、圆柱形或卵珠形;果梗不或几不增大;花被全然脱落,或略为盘状,或近于宿存而不变形。

约 30 种,分布于印度,经我国南部及马来西亚至澳大利亚及太平洋岛屿。我国有 3 种,台湾、广东海南及广西西南部(田阳)各产一种。

分种检索表

1. 果卵球形,较小,长约 2 厘米,直径约 1 厘米;叶厚革质,椭圆形或倒卵形,长 9—12 厘米,宽 4.5—6 厘米;圆锥花序被短柔毛……………1. 革叶土楠 *E. coriacea* Merr.
1. 果长椭圆形或圆柱形,长均在 3 厘米以上,直径 1.4 厘米以上;叶坚纸质或革质,长圆形或长圆状椭圆形;圆锥花序渐变无毛。
 2. 叶一般较小,最大叶长达 15 厘米,宽 5 厘米,坚纸质,中脉和侧脉下面稍凸起,叶柄长 1—1.5 厘米;果序轴粗约 2 毫米,果梗顶端略增粗;果长椭圆形,较小,长达 3.8 厘米,直径 1.4 厘米,熟后紫褐色……………2. 土楠 *E. hainanensis* Merr. et Metc. ex Allen
 2. 叶一般远较大,长 13—20 厘米,宽(4) 5—7.5 厘米,革质,中脉和侧脉下面远为明显凸起,叶柄粗壮,长达 2 厘米;果序轴粗壮,直径达 2.5 毫米,果梗顶端粗达 5 毫米;果圆柱形,较大且长,长达 8 厘米,直径达 2.3 厘米,熟后黑褐色……………3. 长果土楠 *E. dolichocarpa* S. Lee et Y. T. Wei

1. 革叶土楠 三蕊楠(台湾植物志)

Endiandra coriacea Merr. in Govern. Lab. Publ. Philip. 35: 14. 1906; et in Philip. Journ. Sci. 1. Suppl.: 58. 1906; Kanehira et Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. 24: 397, f. 1. 1934; Kanehira, Formos. Trees. rev. ed. 212,