

6. 安龙油果樟

Syndiclis anlungensis H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. 17 (2): 72. 1979.

乔木，高约 8 米，胸径 30 厘米。顶芽小，卵珠形，长约 2 毫米，芽鳞外面密被黄褐色微柔毛。一年生枝条圆柱形，直径达 5 毫米，黑褐色或褐色，密布栓质宽椭圆形皮孔，无毛；当年生枝条纤细，多少压扁，红褐色，略被锈色或黄褐色微柔毛。叶互生，卵状椭圆形至椭圆形，长 6.5—10.5 厘米，宽 2.5—5.5 厘米，先端锐尖，尖头钝，基部宽楔形，边缘略背卷且呈波状，近革质，干时上面红褐色下面淡褐色稍带苍白，幼时两面略被黄褐色微柔毛，老时两面变无毛，侧脉每边约 5 条，与中脉两面明显凸起，末端拱形连结，最下方的侧脉靠近叶基，小脉网结，两面略呈蜂巢状；叶柄长 1—1.5 厘米，腹凹背凸，幼时疏被黄褐色微柔毛，老时变无毛。圆锥花序于一年生枝条上腋生，长 2—3.5 厘米，少花；总梗长 1—1.5 厘米，与各级序轴略被黄褐色微柔毛；小苞片钻形，长不及 1 毫米，被黄褐色微柔毛。花黄色，小，长 1.5 毫米，直径达 2 毫米，花被裂片宽卵圆形，先端锐尖，外面略被微柔毛；花梗长 1.5—3 毫米，略被黄褐色微柔毛。成熟果球形，直径达 5.5 厘米，顶端浑圆，基部略收缩，褐色，无毛；果梗粗壮，长 1.5 厘米，直径 5—7 毫米，顶端处最宽，黑褐色，具栓质椭圆形皮孔。花期 6 月。

产贵州西南部(安龙)。生于山坡上，海拔约 1300 米。

7. 西畴油果樟 图 40: 10—11

Syndiclis sichourensis H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. 17 (2): 72, pl. 11, f. 1. 1979.

乔木，高 6—10 米；树皮灰色或黑灰色。顶芽细小，长 1.5 毫米，芽鳞密被锈色短柔毛。一年生枝条圆柱形，灰色或灰褐色，有不规则纵条纹，密布皮孔，无毛；当年生枝条多少具棱角，有纵向条纹，红褐色，无毛。叶互生，椭圆形，卵状椭圆形至长圆形，长 6—11 厘米，宽 2—5 厘米，先端短渐尖，常偏斜，基部宽楔形或近圆形，两侧常不相等，边缘背卷且呈波状，近革质，干时上面黄褐色，下面淡黄褐色，两面无毛，侧脉每边 4—6 条，与中脉在上面凹陷下面凸起，弧曲状，近叶缘处消失，横脉在上面不明显下面明显，其间由小脉连接成网状；叶柄长 0.8—1.5 厘米，腹平背凸，无毛。圆锥花序腋生，长 1.5—4 厘米，多花，其上常有少数小叶，因而整个花序俨如花枝，序轴多少压扁，红褐色，无毛；小苞片微小，钻形，长约 1.5 毫米，具缘毛，早落。花绿色，小，长仅 2 毫米，直径 2.5 毫米；花梗长 1—2 毫米，无毛。花被外面无毛，内面及边缘被短柔毛，花被筒倒锥形或宽钟形，长达 1.5 毫米，花被裂片正常的为 4，有时为 5，宽三角形，长仅 0.5 毫米，宽达 1.5 毫米，先端钝。能育雄蕊正常的为 4，但有时为 5，均超出花被片，长约 1.5 毫米，呈二轮排列，外轮 2 枚雄蕊基部有一对圆状肾形腺体，花药与花丝近等长，卵圆状三角形，2 室，有时融合为 1 室，室均内向，花丝短小，被短柔毛。退化雄蕊 4，与能育雄蕊对生，线形，密被柔毛，芽时拱弯，