

南植物志 1: 287. 1964.

乔木, 高达 10 米, 胸径达 30 厘米; 树皮褐灰色。小枝褐色, 幼时被锈色绒毛, 老时脱落渐变无毛。顶芽圆锥形, 密被锈色绒毛。叶 5—9 片簇生于枝端成轮生状, 长披针形, 长 13—28 厘米, 个别可达 34 厘米, 宽 2.5—4(—8) 厘米, 先端急尖或渐尖, 基部渐狭或急尖, 近革质, 上面深绿色, 幼时沿中脉有锈色绒毛, 下面粉绿或苍白, 幼时被柔毛, 沿脉毛密, 成长时渐脱落无毛, 被白粉, 羽状脉, 中脉在叶两面均隆起, 侧脉每边约 10 条, 斜展, 先端略弯曲, 在叶上面微平, 下面隆起, 横脉纤细, 在上面稍明显, 在下面明显; 叶柄长 12—20 毫米, 有锈色绒毛。雌、雄花未见。果序伞形, 单生, 总梗长 2—6 毫米, 被贴伏短柔毛; 每一果序有果 4—5 枚; 果实球形, 直径 7—10 毫米, 熟时黑色, 着生于略扁平的、直径约 5 毫米、深约 2 毫米的浅盘状果托上; 果梗长约 5 毫米, 顶端稍增粗, 有贴伏短柔毛。 果期 10 月。

产广东(保亭、琼中)。生于混交林中, 少见。

14. 思茅黄肉楠 麦硬(云南思茅傣语) 图版 65: 1

*Actinodaphne henryi* Gamble in Kew Bull. 265. 1913; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1 (1): 60. 1924; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 157. 1932 et 1934; Allen, in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 407. 1938.


乔木, 高达 25 米, 胸径达 20 厘米以上; 树干端直; 树皮灰白色, 光滑或有细裂纹。小枝圆, 粗壮, 灰褐色, 有浅灰色贴伏绒毛。顶芽大, 卵圆形, 鳞片外面密被黄褐色丝状短柔毛。叶 4—6 片聚生于枝顶, 成轮生状, 披针形, 长 17—40 厘米, 宽 3.7—13 厘米, 先端渐尖或长渐尖, 基部楔形, 革质, 上面深绿色, 略有光泽, 无毛, 下面粉绿, 苍白色, 沿中脉、侧脉有短柔毛, 羽状脉、中脉粗壮, 两面突起, 侧脉每边 9—12 条, 斜展, 近叶缘处弧曲并渐网结而消失, 横脉平行联接, 明显; 叶柄长 2—3 厘米, 粗壮, 密被灰黄色绒毛。伞形花序多个生于长 2—3.5 厘米的腋生总梗上, 排列成总状, 有白色绢状毛; 每一伞形花序梗长 1.5 厘米, 有花 5 朵; 花梗长 2—3 毫米, 花被筒倒圆锥形, 长 2 毫米, 均密被丝状短柔毛; 花被裂片卵圆形, 长约 4 毫米, 宽约 2 毫米, 具 3 条脉。雄花: 能育雄蕊 9, 花丝无毛, 第三轮基部两侧的腺体小, 圆球形。雌花: 退化雄蕊 9, 子房卵形, 无毛, 花柱纤细, 柱头大, 头状。果近球形, 直径 6—8 毫米, 生于深约 2—3 毫米、直径约 5 毫米浅杯状果托上; 果托杯全缘或波状, 外面被短柔毛; 果梗长 5—8 毫米, 被灰黄色短柔毛。 花期 12 月至翌年 2 月, 果期 7—8 月。

产云南南部。生于常绿阔叶林中, 海拔 600—1300 米。

本种木材材质优良, 结构细致, 纹理直, 可供建筑、家具及工业用材。

15. 毛黄肉楠(海南植物志) 茶胶树、刨花、胶木(广东海南), 香胶(广东湛江), 毛樟(广东徐闻), 老人木(广西博白)

*Actinodaphne pilosa* (Lour.) Merr. in Trans. Amer. Philos. Soc. N. S.



1. 思茅黄肉楠 *Actinodaphne henryi* Gamble: 果枝。2. 密花黄肉楠 *A. confertiflora* Meissn.: 果枝。(许芝源绘)