

4. **红叶木姜子**(中国高等植物图鉴) 野春桂(植物名实图考), 油炸条(云南昆明), 鸡油果(云南嵩明), 青皮树(云南富宁), 木姜树(云南屏边), 泡香樟、山茴香、山胡椒(云南保山), 假山胡椒(云南玉溪), 叶上花(云南武定), 辣姜子(云南腾冲), 野气辣子、山胡椒、大山胡椒(四川万源), 野木姜(四川忠县)

Litsea rubescens Lec. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, 5^e Ser. 5, 86. 1913; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 257. 1931; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 183. 1932 et 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 372. 1938; T. T. Yü in Bull. Yunnan Bot. Inst. 1 (1): 25. 1941; 中国高等植物图鉴 1: 843. 图 1686. 1972.—*Litsea rubescens* Lec. f. *nanchuanensis* Yang in Journ. West China Bord. Res. 15 Ser. B: 79. 1945, syn. nov.

4a. **红叶木姜子**(原变种) 图版 71: 1—2

var. *rubescens*

落叶灌木或小乔木, 高 4—10 米; 树皮绿色。小枝无毛, 嫩时红色。顶芽圆锥形, 鳞片无毛或仅上部有稀疏短柔毛。叶互生, 椭圆形或披针状椭圆形, 长 4—6 厘米, 宽 1.7—3.5 厘米, 两端渐狭或先端圆钝, 膜质, 上面绿色, 下面淡绿色, 两面均无毛, 羽状脉, 侧脉每边 5—7 条, 直展, 在近叶缘处弧曲, 中脉、侧脉于叶两面突起; 叶柄长 12—16 毫米, 无毛; 嫩枝、叶脉、叶柄常为红色。伞形花序腋生; 总梗长 5—10 毫米, 无毛; 每一花序有雄花 10—12 朵, 先叶开放或与叶同时开放; 花梗长 3—4 毫米, 密被灰黄色柔毛; 花被裂片 6, 黄色, 宽椭圆形, 长约 2 毫米, 先端钝圆, 外面中肋有微毛或近于无毛, 内面无毛; 能育雄蕊 9, 花丝短, 无毛, 第 3 轮基部腺体小, 黄色; 退化雌蕊细小, 柱头 2 裂。果球形, 直径约 8 毫米; 果梗长 8 毫米, 先端稍增粗, 有稀疏柔毛。花期 3—4 月, 果期 9—10 月。

产湖北、湖南、四川、贵州、云南、西藏、陕西南部。生于山谷常绿阔叶林中空隙处或林缘, 海拔 700—3800 米。

4b. **滇木姜子**(变种)

var. *yunnanensis* Lec. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, 5^e Ser. 5, 86. 1913; Liou Ho, Laurac. Chine et Indoch. 183. 1932 et 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 372. 1938; 中国高等植物图鉴 1: 843. 1972.

与原变种不同在于叶片圆状椭圆形; 每一伞形花序有花 15—18 朵。

产云南东北及西北、贵州。生于山坡林下或灌丛中, 海拔 2300—3400 米。

5. **宜昌木姜子**(中国高等植物图鉴) 狗酱子树(湖北宣恩) 图版 71: 3

Litsea ichangensis Gamble in Sarg Pl. Wils. 2: 77. 1914; Chun in Contr. Biol. Sci. Soc. China 1 (5): 58. 1925; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 180. 1932 et 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 371. 1938; 中国高等植物图鉴 1: 843. 图 1685. 1972.