

产四川。生于山谷溪旁疏林中,海拔 500—2100 米。

民间用其果实代替“毕澄茄”作药用。

8c. 峨眉木姜子

var. glabrescens H. S. Kung in Fl. Sichuan. 1: 117, 461. 1981. 与原变种不同在于枝、叶初时疏被毛,后变无毛。

产四川。生于山地林中,海拔 1100 米以下。

C. K. Allen 发表四川木姜子 *L. szechuanica* Allen 时还混淆有几个不同的种,经核对现存的标本,秦岭地区 Fenzel 507 (雄花标本),与四川木姜子有着明显区别,另立为秦岭木姜子(详见秦岭木姜子 *L. tsinlingensis* Yang et Huang),四川峨眉山标本(汪发瓚 23151 号)为宝兴木姜子,俞德浚 705 号为钝叶木姜子 *L. veitchiana* Gamble,而云南蔡希陶 55967 号则为香叶树 *Lindera communis* Hemsl. 之误。

9. 独龙木姜子 图版 74: 3—5

Litsea taronensis H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. 16 (4): 47. pl. 2, f. 3. 1978.

落叶乔木,高 15 米。小枝、黑褐色,较粗壮,被灰黄色微柔毛。顶芽长圆锥形,鳞片外被灰黄色微柔毛。叶互生,椭圆形或长圆形,长 11—13.5 厘米,宽 3.2—4.5 厘米,两端渐狭,坚纸质,上面绿色,光亮,初时有微柔毛,老时无毛,下面淡绿色,密被灰黄色短绒毛,沿脉有稀疏短柔毛,羽状脉,侧脉每边 5—6 条,斜展,弧曲状,至叶缘处消失,中脉、侧脉在叶上面下陷,下面突起,横脉网结,在下面明显突起;叶柄长 1.2—1.5 厘米,腹面下陷,具灰黄色微柔毛,老时近于无毛。伞形花序成对生于长约 3 毫米的总梗上;苞片近圆形,两面密被灰黄色微柔毛;花序总梗长 5—6 毫米,粗 1.5 毫米,密被灰黄色丝状短柔毛;每一花序有雄花 12—14 朵;花梗长 3—4 毫米,密被灰黄色丝状柔毛;花被裂片 6,卵形或卵圆形,先端圆钝,外面基部及中肋有灰黄色丝状柔毛,内面基部有毛;能育雄蕊 9,花丝具灰黄色柔毛,第 3 轮基部腺体圆状心形,近于无柄;无退化雌蕊。

产云南西北部。生于山坡阔叶林中,海拔 2200 米。

本种花序较特别,成对生于具顶芽的短总梗上,颇易识别。

10. 清香木姜子(中国高等植物图鉴) 毛梅桑(云南沙族语) 图版 75: 2—4

Litsea euosma W. W. Sm. in Notes Bot. Gard. Edinburgh 13: 166. 1921; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 187. 1932 et 1934; Chien et Cheng in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China 9: 294. 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 368. 1938; T. T. Yü in Bull. Yunnan Bot. Inst. 1 (1): 25. 1941; 中国高等植物图鉴 1: 840. 图 1680. 1972.

落叶小乔木,高 10 米;树皮灰绿或灰褐色。幼枝有短柔毛。顶芽圆锥形,外被黄褐色柔毛。叶互生,卵状椭圆形或长圆形,长 6.5—14 厘米,宽 2.2—4.5 厘米,先端渐尖,基部



1—2. 贡山木姜子 *Litsea gongshanensis* H. W. Li: 1. 花枝, 2. 雄花, 上面观。3—5. 独龙木姜子 *L. taronensis* H. W. Li: 3. 花枝, 4. 雄花, 外面观, 5. 雄花, 纵剖面。(李锡畴绘)