

有花8—20朵；花梗长5—7毫米，密被柔毛；花被裂片6，椭圆形，淡黄色，有3条脉；能育雄蕊9，有时6或12，花丝短，无毛，第3轮基部腺体黄色；退化子房卵形。果近球形，直径约5毫米，顶端有明显小尖头；果梗长1.5—2厘米。花期4—5月，果期8—9月。

产四川西部、云南西北部、西藏东南部。生于山坡路旁、灌木丛中或针阔混交林中，海拔400—3400米。印度、尼泊尔也有分布。

本种与钝叶木姜子 *L. veitchiana* Gamble 极相似，惟本种叶片长圆状披针形，先端渐尖，叶下面脉上绢毛的颜色较深，褐色，花序总梗无毛，而后者叶片倒卵状长圆形或倒卵形，先端急尖或钝，叶下面绢毛同色，花序总梗有毛，可以区别。

14. 钝叶木姜子(中国高等植物图鉴) 木香子(四川)

Litsea veitchiana Gamble in Sarg. Pl. Wils. 2: 76. 1914; Chun in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China 1 (5): 59. 1925; Hand.-Mazz. Sym. Sin. 7: 256. 1931; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 182. 1932 et 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 370. 1938; 中国高等植物图鉴 1: 841. 1972.——*Litsea chenii* Liou, Laur. Chine et Indoch. 183. 1932 et 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 373. 1938; 陈嵘, 中国树木分类学 ed. 2, 362. 1957; 中国高等植物图鉴 1: 842. 图 1684. 1972, syn. nov.

14a. 钝叶木姜子(原变种) 图版 73: 1

var. *veitchiana*

落叶灌木或小乔木，高达4米；树皮灰褐色或黑褐色。幼枝被黄白色长绢毛，以后毛脱落变无毛。顶芽圆锥形，鳞片无毛或上部被微短柔毛。叶互生，倒卵形或倒卵状长圆形，长4—12厘米，宽2.5—5.5厘米，先端急尖或钝，基部楔形或宽楔形，纸质，幼时两面密被黄白色或锈黄色长绢毛，老时毛渐脱落上面无毛或仅中脉有毛，下面有稀疏长绢毛，羽状脉，侧脉每边6—9条，中脉、侧脉在上面微突，在下面突起，连结侧脉之间的小脉微突；叶柄长1—1.2厘米，幼时密被黄白色或锈黄色长绢毛，后毛渐脱落变无毛。伞形花序生于去年枝顶，单生，先叶开放或与叶同时开放；花序总梗长6—7毫米，有柔毛，每一花序有花10—13朵，淡黄色；花梗长5—7毫米，密被柔毛，花被裂片6，椭圆形或近圆形，有脉3条，具腺点；能育雄蕊9，花丝基部有柔毛，第3轮基部腺体大；退化子房卵形；雌花中退化雄蕊基部具柔毛；子房卵圆形，花柱短，柱头头状。果球形，直径约5毫米，成熟时黑色；果梗长1.5—2厘米，有稀疏长毛。花期4—5月，果期8—9月。

产湖北、四川、贵州、云南西北部。生于山坡路旁或灌木丛中，海拔400—3800米。

刘厚根据四川峨眉山太子坪采的雄株标本(陈嵘7091号)，发表 *L. chenii* Liou，该号标本是10月份采集的，小枝和叶柄的毛已秃净，叶片下面仅沿叶脉有灰白色长毛，其余毛已秃净，花的部分仅依花芽的解剖特征描述，我们检查了 *L. chenii* Liou 的同模式标本(Isotypus) 和模式产地的大量标本后发现它与钝叶木姜子是同种植物，故予归并。