

了几个变种,但据观察,在同一植株上或在同一标本上均能找到这些变化,我们同意 *Ko-stermans* 将其变种统统归并的意见。

18. **黄椿木姜子** (海南植物志) 黄心槁(广东琼东),尖尾树(广东澄迈),黄肚槁(广东吊罗山),阁力(广东尖峰岭),尖尾樟(广东徐闻),大烂花(广西上思)

Litsea variabilis Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 386. 1891; Lec. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 5^e Sér. 5: 48, 51, 52, 90. 1913; Chun in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China 1 (5): 64. 1925; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 188. 1932 et 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 393. 1938; 海南植物志 1: 294. 1964.

18a. **黄椿木姜子**(原变种)

var. *variabilis*

常绿灌木或乔木,高达 15 米;树皮灰色,灰褐色或黑褐色。小枝纤细,有微柔毛或近于无毛。顶芽圆锥形,外面被灰色贴伏短柔毛。叶对生或近对生,也兼有互生,形状多变化,一般为椭圆形或倒卵形,长 5—7 厘米,有时达 14 厘米,宽 2—4.5 厘米,先端渐尖,钝或略圆,基部楔形或宽楔形,革质,干时常带红色,无毛或近于无毛,羽状脉,侧脉每边 5—6 条,纤细,在叶片上面平,在下面突起,中脉在上面下陷,在下面突起,网脉在下面较明显;叶柄长 8—10 毫米,褐色,近基部处膨大,无毛或近于无毛。伞形花序常 3—8 个集生叶腋,极少单生;总梗短,有短柔毛;苞片小;每一雄花序有花 3 朵,花梗极短;花被裂片 6,匙形,外面中肋有柔毛;能育雄蕊 9,花丝被疏毛,腺体小,圆形,黄色,近于无柄。果球形,直径 7—8 毫米,熟时黑色;果托碟状,直径约 5 毫米;果梗极粗短,与果托相连无明显界线。花期 5—11 月,果期 9—翌年 5 月。

产广东、广西南部。生于阔叶林中或林中溪旁,海拔 300—1700 米。越南、老挝也有分布。

材质坚硬略重,不易开裂,不溃湿,且不受虫蛀,可供家具、建筑用材。

可分两变型。一为**原变型** f. *variabilis*。二为**雄鸡树**(广东琼海)(变型),也称鼠刺木姜华南变型(海南植物志) f. *chinensis* (Allen) Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax. Sin. 16 (4): 49. 1978.——*Litsea iteodaphne* (Nees) Hook. f. f. *chinensis* Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 393. 1938; 海南植物志 1: 294. 1964. 与原变型区别在于叶片披针形至长椭圆状披针形,长 13—22.5 厘米,宽 2.2—3.5 厘米,侧脉每边 15—17 条,叶下面网脉不明显。产广东(海南)、广西南部、云南东南部,生于混交林内或疏林中,海拔 500—840 米。本变型果为球形,花的特征以及叶、芽入秋后一般都变红色,均与黄椿木姜子(原变型)同,且地理分布亦一致,故转移其种下。

18b. **毛黄椿木姜子**(变种)

var. *oblonga* Lec. in Nouv. Arch. Hist. Nat. Paris 5^e Sér. 5: 90. 1913;