

Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 393. 1938.——*Litsea variabilis* Hemsl. var. *tonkinensis* Lec. Fl. Gén. Indoch. 5: 134. 1914.

与原变种不同在于小枝、叶下面和叶柄均密被灰黄色贴伏柔毛，叶片椭圆形或长圆形，长7—14厘米，宽2.5—4厘米，叶下面粉绿，网脉不明显。

产广西西部及西南部、云南东南部。生于山坡密林中，海拔600—900米。越南也有分布。

19. 剑叶木姜子(海南植物志)

Litsea lancifolia (Roxb. ex Nees) Benth. et Hook. f. ex F.-Vill. in Blanco, Fl. Filip. ed. 3, 4: (Nov. App.) 181. 1880; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 395. 1938; 海南植物志 1: 290. 1964.——*Tetranthera lancifolia* Roxb. ex Nees in Wall. Pl. Asiat. Rar. 2: 65. 1831.

19a. 剑叶木姜子(原变种)

var. *lancifolia*

常绿灌木，高约3米；树皮黑色。小枝灰褐色，被锈色绒毛。顶芽外面被锈色绒毛。叶对生，或兼有互生，椭圆形，长圆形或椭圆状披针形，长5—10厘米，宽2.4—4.5厘米，先端急尖或渐尖，基部宽楔形或近圆，薄革质，上面深绿色，初时有柔毛，老时除中脉留有毛外，其余无毛，下面苍白绿色，有黄褐色或锈色绒毛，羽状脉，侧脉每边5—8条，斜展，中脉、侧脉在上面微陷，下面稍突起，网脉不明显；叶柄短，长约3毫米，密被锈色绒毛。伞形花序单生或几个簇生叶腋；总梗极短或几无总梗；苞片4，每一雄花序常有花3朵，花细小；花梗短，长约1毫米，有褐色长柔毛；花被裂片6，披针形或长圆形，外面有长柔毛，内面无毛；能育雄蕊9，有时6，花丝有柔毛，腺体小，圆形，无柄；退化雌蕊细小，子房卵圆形，无毛。果球形，直径约1厘米；果托浅碟状，直径约5毫米；果梗短，长3毫米。花期5—6月，果期7—8月。

产广东(海南)、广西西南部、云南南部。生于山谷溪旁或混交林中，海拔1000米以下。印度、不丹、越南、菲律宾以及加里曼丹岛也有分布。

19b. 有梗木姜子(变种)

var. *pedicellata* Hook. f. Fl. Brit. India 5: 159. 1886; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 396. 1938.

与原变种不同在于幼枝、叶片下面、叶柄均被贴伏灰黄色短柔毛；叶片长圆形或披针形，基部楔形；叶柄长5—10毫米；总花梗长5—7毫米，纤细。

产云南南部。生于山坡灌丛、溪旁及混交林中，海拔120—1700米。印度也有分布。

19c. 椭圆果木姜子(变种)

var. *ellipsoidea* Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax. Sin. 16 (4): 49. 1978.