

与原变种不同在于叶片披针形或长圆状披针形；果椭圆形，长 15 毫米，直径 7 毫米。产云南南部及西部。生于山谷林中，海拔 1200—2000 米。

20. 圆叶豺皮樟(广州植物志)

Litsea rotundifolia Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 385, 1891; Chun in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China 1 (5): 63. 1925; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 182. 1932 et 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 385. 1938; 广州植物志 93. 1956.——*Laurus rotundifolia* Wall. List. no. 2591. 1830. nomen nudum.——*Iozoste rotundifolia* Nees in Wall. Pl. Asiat. Rar. 2: 63. 1831 (based on *Tetranthera rotundifolia* Wall.)——*Tetranthera rotundifolia* Wall. ex Nees l. c. in syn. (based on *Laurus rotundifolia* Wall.)——*Actinodaphne chinensis* var. *rotundifolia* Nees, Syst. Laurin. 600. 1836 (based on *Tetranthera rotundifolia* Wall.)——*Iozoste chinensis* var. *rotundifolia* Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. 1: 364. 1851 (based on *Tetranthera rotundifolia* Wall.)——*Actinodaphne rotundifolia* Merr. Lingnan Sci. Journ. 15: 419. 1936, syn. p. p.

20a. 圆叶豺皮樟(原变种)

var. *rotundifolia*

常绿灌木或小乔木，高可达 3 米；树皮灰色或灰褐色，常有褐色斑块。小枝灰褐色，纤细，无毛或近无毛。顶芽卵圆形，鳞片外面被丝状黄色短柔毛。叶散生，宽卵圆形至近圆形，小，长 2.2—4.5 厘米，宽 1.5—4 厘米，先端钝圆或短渐尖，基部近圆，薄革质，上面绿色，光亮，无毛，下面粉绿色，无毛，羽状脉，侧脉每边通常 3—4 条，中脉、侧脉在叶上面下陷，下面突起；叶柄短粗，长 3—5 毫米，初时有柔毛，以后毛脱落变无毛。伞形花序常 3 个簇生叶腋，几无总梗；每一花序有花 3—4 朵，花小，近于无梗；花被筒杯状，被柔毛；花被裂片 6，倒卵状圆形，大小不等；能育雄蕊 9，花丝有稀疏柔毛，腺体小，圆形；退化雌蕊细小，无毛。果球形，直径约 6 毫米，几无果梗，成熟时灰蓝黑色。花期 8—9 月，果期 9—11 月。

产广东、广西。生于低海拔山地下部的灌木林中或疏林中。

20b. 卵叶豺皮樟(变种)

var. *ovatifolia* Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax. Sin. 16 (4): 49. 1978.

与原变种不同在于叶卵形，长 4—7 厘米，宽 1.5—2.7 厘米，先端渐尖或短渐尖，基部圆形，两面网脉明显；叶柄长 6—10 毫米。

产广东。生于河边。

20c. 豺皮樟(变种) 白叶仔、硬钉树、假面果、嗜喳木(广东)，圆叶木姜子(台湾植物志)

var. oblongifolia (Nees) Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 386. 1938; 广州植物志 93. 1956; 海南植物志 1: 293. 1964; 刘业经, 台湾木本植物志 151. 1972; C. E. Chang in Fl. Taiwan 2: 447. 1976.——*Litsea chinensis* Bl. Bijdr. 565. 1825, non Lam.——*Iozoste rotundifolia* Nees var. *oblongifolia* Nees in Hook. f. et Arnott, Bot. Beechey Voy. 209. 1836 (based on *Litsea chinensis* Bl.)——*Actinodaphne chinensis* var. *oblongifolia* Nees, Syst. Laur. 600. 1836 (based on *Litsea chinensis* Bl.)——*Iozoste chinensis* Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. 1: 364. 1851 (based on *Litsea Chinensis* Bl.)——*Actinodaphne chinensis* Nees, Syst. Laur. 600. 1836; 中国高等植物图鉴 1: 847. 图 1694. 1972.——*Actinodaphne hypoleucophylla* Hay. Icon. Pl. Formos. 5: 169. f. 60e. 1915.

与原变种不同在于叶片卵状长圆形, 长 2.5—5.5 厘米, 宽 1—2.2 厘米, 先端钝或短渐尖, 基部楔形或钝。

产广东、广西、湖南、江西、福建、台湾、浙江(平阳)。生于丘陵地下部的灌木林中或疏林中或山地路旁、海拔 800 米以下。越南也有分布。

种子含脂肪油 63.80%, 可供工业用。叶、果可提芳香油, 根含生物碱、酚类、氨基酸, 叶含黄酮甙、酚类、氨基酸、糖类等, 可入药。

21. 朝鲜木姜子 鹿皮斑木姜子(台湾植物志)

Litsea coreana Lévl. in Fedde, Rep. Sp. Nov. 10: 370. 1912, p. p.; Nakai, Fl. Sylv. Kor. 22: 38, 55. 1939; Kosterm. in Reinwardtia 9 (1): 108. 1974.——*Daphnidiun lancifolium* Sieb. et Zucc. in Abh. Bayer Akad. Wiss. Math. Phys. Cl. 4 (3): 207. (Fam. Nat. Fl. Jap. 2: 83) 1846.——*Iozoste lancifolia* (Sieb. et Zucc.) Bl. Mus. Bot. Lugd. Bat. 1: 364. 1851.——*Actinodaphne lancifolia* (Sieb. et Zucc.) Meissn. in DC. Prodr. 15 (1): 211. 515. 1864; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 406. 1938; 刘业经, 台湾木本植物志 154. 图 34. 1972.——*Litsea zuccarinii* Kosterm. in Reinwardtia 8: 117. 1970.——*Litsea orientalis* C. E. Chang in Fl. Taiwan 2: 446. 1976.——*Litsea lancifolia* auct. non (Roxb.) Benth. et Hook. f. ex F.-Vill. 1880, nec (Roxb. ex Wall.) Hook. f. 1886; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 382. 1891; Matsum. et Hay. Enum. Pl. Form. 352. 1906.

21a. 朝鲜木姜子(原变种)

var. coreana

常绿乔木, 高 8—15 米, 胸径 30—40 厘米; 树皮灰色, 呈小鳞片状剥落, 脱落后呈鹿皮斑痕。幼枝红褐色, 无毛, 老枝黑褐色, 无毛。顶芽卵圆形, 先端钝, 鳞片无毛或仅上部有毛。叶互生, 倒卵状椭圆形或倒卵状披针形, 长 4.5—9.5 厘米, 宽 1.4—4 厘米, 先端钝渐