

1695. 1972.——*Iozoste hirtipes* Migo in Bull. Shanghai Sci. Inst. 14: 300. 1944.

与原变种不同在于叶片长圆形或披针形,先端多急尖,上面较光亮,幼时基部沿中脉有柔毛;叶柄上面有柔毛,下面无毛。

产浙江、江苏、安徽、河南、湖北、江西、福建。生于山地杂木林中,海拔900米以下。

民间用根治疗胃脘胀痛。

本变种过去常与豺皮樟 *Litsea rotundifolia* Hemsl. var. *oblongifolia* (Nees) Allen 混淆,均被错误鉴定为 *Litsea chinensis* Bl., 但本变种树皮呈小鳞片状剥落,剥落后呈鹿斑痕,果梗粗壮,而且扁平,果托上宿存有花被裂片,果成熟由红色变黑色;而豺皮樟树皮不呈小鳞片状剥落,无鹿皮斑痕,果则几果梗,又无残留花被片。成熟时蓝黑色,具白粉,极易区别。

21c. 毛豹皮樟(变种) 图版 77: 2—3

var. *lanuginosa* (Migo) Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax. Sin. 16 (4): 50. 1978.——*Iozoste hirtipes* Migo var. *lanuginosa* Migo in Bull. Shanghai Sci. Inst. 14: 300. 1944.

与原变种不同在于嫩枝密被灰黄色长柔毛,嫩叶两面均有灰黄色长柔毛,下面尤密,老叶下面仍有稀疏毛,叶柄长1—2.2厘米,全面有灰黄色长柔毛。

产浙江、安徽、河南、江苏、福建、江西、湖南、湖北、四川、广东北部、广西、贵州、云南(嵩明、富民)。生于山谷杂木林中 海拔300—2300米。

22. 湖北木姜子 图版 77: 4

*Litsea hupehana* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 26: 382. 1891; Chun in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China 1(5): 64. 1925; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 178. 1932 et 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 391. 1938.

常绿乔木或小乔木,高达10米,胸径达20厘米;树皮灰色,呈小鳞片状剥落,脱落后呈鹿皮斑痕。幼枝红褐色,被灰色短柔毛,后毛脱落变无毛,老枝黑褐色,无毛。顶芽卵圆形,鳞片外面被丝状短柔毛。叶互生,狭披针形、披针形至椭圆状披针形,长10—13厘米,宽2—3.5厘米,先端渐尖或尖锐,基部近圆或楔形,薄革质,上面绿色,有光泽,中脉近基部有柔毛,下面淡绿色,具白粉,沿中脉两侧有灰白色长柔毛,羽状脉,侧脉每边10—19条,斜展,先端弧状弯曲,纤细,在叶两面略突起,中脉在上面微突,在下面突起;叶柄长1—1.8厘米,上面散生柔毛,下面无毛。伞形花序单生或2个簇生于叶腋;总梗长约2毫米,被丝状短柔毛;每一花序有雄花4—5朵;花梗长3—4毫米,被灰色丝状柔毛;花被裂片6,卵形,长2毫米,先端渐尖,外面被丝状短柔毛;能育雄蕊9,长约4毫米,花丝被灰色长柔毛,腺体盾状,无柄。果近球形,直径7—8毫米;果托扁平,宿存有花被裂片6,直立,整齐;果梗长3—4毫米,颇粗壮。花期8—9月,果期5—6月。

产湖北西部、四川东部。生于山坡阔叶林中,海拔850—1400米。



1. 豹皮樟 *Litsea coreana* Lévl. var. *sinensis* (Allen) Yang et P. H. Huang: 果枝。2—3. 毛豹皮樟 *L. coreana* Lévl. var. *lanuginosa* (Migo) Yang et P. H. Huang: 果枝。4. 湖北木姜子 *L. hupehana* Hemsl.: 果枝。(宗维城绘)