

Hemsley 根据在湖北房县采的标本 (A. Henry 6607, 6660) 描述本种, 长期以来, 在鉴定上较为混乱, 我们检查了 A. Henry 6660 号标本和模式产地标本, 发现与原描述不一致, 原描述叶片两面无毛, 实际上叶片上面中脉近基部处有柔毛, 叶下面沿中脉两侧有灰白色长柔毛。本种树皮呈小鳞片状剥落, 脱落后呈鹿皮斑痕, 与豹皮樟、毛豹皮樟相似。但本种叶片较长而狭, 叶片下面仅沿中脉两侧有灰色长柔毛, 侧脉较多, 叶下面粉白, 容易识别。

23. 红河木姜子 文山木姜子 (中国植物图谱)

Litsea honghoensis Liou in Bull. Soc. Bot. France 80: 567. 1933; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 375. 1938. — *Litsea wenshanensis* Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. 5: 308. 1934; Allen in l. c. 1938.

常绿乔木, 高达 10 米, 直径 30 厘米; 树皮黑灰色或黄绿带棕褐斑块。小枝无毛, 干后黄褐色或紫红褐色。顶芽卵圆形, 先端钝, 鳞片外面被丝状短柔毛。叶互生或集生于枝顶, 长椭圆形至倒卵状披针形, 长 10—19 厘米, 宽 2—6 厘米, 先端渐尖至突尖, 基部楔形, 革质, 上面黄绿色, 无毛, 下面粉绿色, 无毛或沿脉有毛, 羽状脉, 中脉两面隆起, 较粗壮, 侧脉每边 7—10 条, 直展, 或近叶缘处弯曲; 叶柄长 1—1.5 厘米, 无毛。伞形花序簇生或单生叶腋; 总梗长 8—12 毫米, 无毛; 苞片圆形, 每一花序有雄花 3—5 朵; 花梗长 2 毫米, 有柔毛; 花被裂片 6, 圆形; 能育雄蕊 9, 花丝无毛, 第 3 轮基部的腺体长椭圆形, 大, 无柄; 退化雌蕊无毛, 花柱细, 柱头点状; 雌花花被裂片卵形; 退化雄蕊无毛; 雌蕊长 3 毫米, 花柱短, 柱头盘状。果球形, 直径 2—3 厘米; 果梗长约 3 毫米, 先端稍粗壮, 具宿存花被裂片; 果序总梗长 3 毫米。花期 2—3 月, 果期 8—9 月。

产云南东南部及南部。生于山谷林中, 海拔 1300—2200 米。

24. 蜂窝木姜子 图版 78: 5—11

Litsea foveolata Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax. Sin. 16 (4): 50. f. 9. 1978.

常绿灌木或小乔木, 高 3—5 米。幼枝灰褐色, 被灰黄色长柔毛, 老枝褐色, 有毛或近于无毛。顶芽卵圆形, 鳞片外面被密柔毛。叶互生或集生枝顶, 椭圆形或长圆形, 长 5—22 厘米, 宽 2.2—7 厘米, 先端突尖或短渐尖, 基部楔形, 羊皮革质, 上面深绿色, 有显著的蜂窝状小穴, 暗晦无光泽, 下面浅绿色, 沿脉有柔毛, 羽状脉, 侧脉每边 10—16 条, 直展至近叶缘处弧曲, 较纤细, 在上面微陷或略平, 在下面突起, 中脉在叶上面下陷, 在下面突起; 叶柄长 4—7 (20) 毫米, 密被灰黄色长柔毛。伞形花序常 2 个簇生于枝顶叶腋, 花序总梗长 2—3 毫米, 有短柔毛; 苞片 4, 近圆形, 质厚, 外面被短柔毛, 内面无毛, 开花时宿存; 每一花序有花 4—5 朵; 花梗短, 长 1 毫米, 具灰色柔毛; 花被裂片 6, 卵形或倒卵形, 长 2 毫米, 宽 1 毫米, 外面无毛或仅基部有柔毛, 内面基部有长柔毛; 能育雄蕊 9—12, 花丝外露, 长 4 毫米, 有灰黄色长柔毛, 腺体盾状或倒圆锥状, 具短柄; 退化雌蕊细小, 长 1.5 毫米, 子