

房卵形，花柱细长，柱头盾状，均无毛。果球形，直径10毫米；果梗极短，长1—2毫米，先端增粗，常宿存有花被裂片；果序总梗长2—3毫米，常宿存有苞片。花期7月，果期12月。

产广西(武鸣、大新、龙州)。生于石灰岩山坡疏林或密林中，海拔300—700米。

本种近伞花木姜子 *L. umbellata* (Lour.) Merr. 但小枝、叶下面、叶柄和总花梗密被灰黄色柔毛，叶质地厚，上面具明显蜂窝状小穴，暗晦无光泽，雄伞形花序1—2个腋生，每一花序有花5朵，苞片较厚，花被裂片外面仅基部有柔毛，雄花中有退化雌蕊，果较大，直径10毫米；而后者小枝、叶下面及总花梗密被锈色绒毛，叶质地较薄，上面无蜂窝状小穴，雄花序3—6个腋生，苞片薄，每一花序有花4朵，花被裂片外面被锈色绒毛，雄花中无退化雌蕊，果较小，直径6毫米，容易区别。

25. 伞花木姜子 米打东(广西扶绥)

Litsea umbellata (Lour.) Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. 14: 242. 1919; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 396. 1938—*Hexanthus umbellatus* Lour. Fl. Cochinch. 196. 1790.—*Litsea hexantha* Juss. in Ann. Mus. Hist. Nat. Paris 6: 212. 1805 (based on *Hexanthus umbellatus* Lour.).—*Tetranthera ferruginea* R. Br. Prodr. 403. 1810, quoad Syn. Lour.—*Litsea amara* Bl. Bijdr. 563. 1825.—*Tetranthera amara* Nees, Syst. Laur. 551. 1836.

常绿灌木或小乔木，高3—9米，胸径达20厘米；树皮灰褐色。小枝褐色，被锈色绒毛；顶芽卵圆形，鳞片外面被锈色绒毛。叶互生，椭圆形或长圆状卵形，长6—12厘米，宽3—4.2厘米，先端渐尖，基部突尖或钝，薄革质，上面深绿色，有光泽，下面浅绿色，被锈色绒毛，羽状脉，侧脉每边8—15条，直展，呈羽毛状排列，中脉、侧脉在叶上面微陷或侧脉微突，在下面突起；叶柄长6—8毫米，被锈色绒毛。伞形花序腋生，总梗粗短，长2—3毫米，有锈色绒毛；常3—6个花序簇生，花序梗长2—3毫米，被锈色绒毛；苞片外面被锈色绒毛；每一雄花序有花4朵；花梗长1—1.5毫米，有锈色长柔毛；花被裂片6，披针形或卵形，细小，长1.5毫米，宽0.5—0.8毫米，大小不等，外面被锈色长柔毛；能育雄蕊9，长1.8毫米，花丝有长毛，腺体肾形，无柄；无退化雌蕊。果球形或卵圆形，直径约6毫米，先端具小尖；果托浅碟状，边缘常宿存有花被裂片；果梗长3毫米，先端增粗，被锈色绒毛。花期4—5月，果期8—9月。

产广西西南部、云南南部。生于山谷、丘陵的灌丛或疏林中，海拔300—1000米。越南、老挝、柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚均有分布。

26. 假辣子(云南河口) 米粮价(云南河口)

Litsea balansae Lec. Fl. Gén. Indoch. 5: 135. 1914; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 191. 1932 et 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 396. 1938.