

35. 滇南木姜子

Litsea garrettii Gamble in Kew Bull. 204. 1913; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 196. 1932 et 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 388. 1938.

常绿乔木，高4—12米。小枝褐色，纤细，幼时有淡黄色柔毛。顶芽卵圆形，外被黄褐色短柔毛。叶互生，长椭圆形，长8—16厘米，宽3.6—6厘米，先端长渐尖或渐尖，或略为镰刀状渐尖，基部楔形，革质，上面深绿色，有光泽，下面淡绿色，具锈色绒毛，后毛渐脱落至近无毛，羽状脉，侧脉每边6—8条，近叶缘处呈弧形弯曲连接，中脉纤细，初时在叶上面沿中脉有毛，网脉在叶下面明显；叶柄长1—2厘米，被锈色绒毛。伞形花序4—8生于长1.5—4厘米的短枝上呈总状花序；伞形花序梗长8—10毫米，被柔毛；苞片4，卵形；每一伞形花序有雄花5朵，花梗长6—8毫米；花被裂片6，黄色，长圆形，长5毫米，先端钝，外面被丝状毛；能育雄蕊9，花丝有毛，腺体肾形，细小，有柄；退化雌蕊细小，无毛。雌花较雄花小；花被裂片长2—3毫米；退化雄蕊9—12，有毛；子房卵圆形，无毛，花柱粗而弯曲，柱头盾状。果长圆形，长1—1.5厘米，直径5—6毫米，先端有尖头，成熟时黑色；果托杯状，深约3毫米，直径6毫米；果梗长6—8毫米，但有时达13毫米，稍增粗。花期10—11月，果期6—7月。

产云南南部。生于灌丛或阔叶林中，海拔750—2000米。泰国、缅甸也有分布。

36. 西藏木姜子 图版81: 1

Litsea tibetana Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax. Sin. 16(4): 52, f. 10. 1978.

常绿灌木。一年生枝具褐色密毛。叶互生，长椭圆形或椭圆状披针形，长6—12厘米，宽2.5—4厘米，先端渐尖，基部多为宽楔形，薄革质，上面无毛，下面具褐色柔毛，幼时叶缘有睫毛，后毛渐脱落，羽状脉，侧脉每边8—12条，斜展，沿叶缘处弯曲，叶脉在上面下陷，在下面突起，下面横脉明显；叶柄长约1厘米，被褐色柔毛。果长圆形，长1.2—1.5厘米，直径6—8毫米；果托浅盘状，外面有柔毛；果梗长约1厘米，先端稍增粗。果期8—9月。

产我国西藏东南部。生于山坡灌丛中，海拔1260米。

本种与伞花木姜子 *L. umbellata* (Lour.) Merr. 及滇南木姜子 *L. garrettii* Gamble 相近，与前者区别，本种小枝、叶下面、叶柄密被褐色柔毛，叶下面横脉明显，果长圆形，果托无宿存花被裂片；与后者不同，本种叶柄较短，侧脉较多，花序伞形，果托不为深杯状。

37. 长蕊木姜子

Litsea longistaminata (Liou) Kosterm. in Reinwardtia 7: 106. 1969. —
Litsea garrettii Gamble var. *longistaminata* Liou, Laur. Chine et Indo-