

ch. 196. 1932 et 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 388. 1938.

常绿乔木,高达10米,胸径达20厘米;树皮灰色。小枝褐色,有黄褐色或锈色绒毛。顶芽卵圆形,外被黄褐色或锈色绒毛。叶互生,倒卵形至倒卵状长圆形,长10—25厘米,宽4.6—11.5厘米,先端圆,具突尖头或渐尖,基部楔形或钝,薄革质,上面黄绿色,有光泽,下面浅绿色,有短柔毛,后毛渐脱落至近无毛,羽状脉,侧脉每边7—9条,近叶缘处呈弧形弯曲连结,连结侧脉的小脉在叶下面明显突起,中脉较粗壮,在叶上面下陷,下面突起,侧脉在上面下陷或略平,在下面突起;叶柄粗壮,长1—2厘米,初时密被锈色绒毛。伞形花序4—6个生于短枝上排成总状;雄花序短枝较长,雌花序较短,均被锈色绒毛;每一雄伞形花序总梗长约1厘米,有锈色绒毛,有花5—6朵;花梗长2.5—3毫米,被灰黄色柔毛;花被裂片6,长圆形或卵圆形,长约2.5毫米,宽1.8毫米,外面基部及中肋有灰黄色柔毛;能育雄蕊9,长达7毫米,外露,花丝有柔毛;腺体小,有柄;退化雌蕊细小,长2.5毫米,无毛;雌花子房卵形或卵圆形,长1.8毫米,花柱长1毫米,柱头盾状2裂;退化雄蕊长1毫米,有柔毛。果长圆形,长1.7厘米,直径约8毫米,先端有小尖头;果托盘状,直径3—4毫米;果梗较粗,长3—4毫米,有柔毛。花期12月至翌年1月,果期6—7月。

产云南南部。生于开旷山坡、山谷、灌丛或混交林中,海拔800—2000米。越南也有分布。

38. 红皮木姜子

Litsea pedunculata (Diels) Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax. Sin. 16(4): 52. 1978. — *Lindera pedunculata* Diels in Engler, Bot. Jahrb. 29: 350. 1901; Allen in Journ. Arn. Arb. 22: 11. 1941. — *Litsea merrilliana* Allen in l. c. syn. nov. — *Pseudolitsea tsaii* Yang in Journ. West China Bord. Res. Soc. 15 Ser. B: 85. 1945, syn. nov.

38a. 红皮木姜子(原变种)

var. *pedunculata*

常绿灌木或小乔木,高达6米;树皮褐色,内皮紫红色。幼枝红褐色,无毛或近于无毛,老枝灰色或灰褐色,无毛。顶芽卵圆形,细小,鳞片外面被丝状黄色短柔毛。叶互生,长圆状披针形至椭圆形,长3.5—7厘米,宽1.5—3厘米,先端急尖或渐尖,基部楔形,钝或近圆形,薄革质,上面深绿色,下面粉绿色,两面均无毛,羽状脉,侧脉每边8—12条,直展,先端弧曲,边叶缘处消失,中脉两面突起,侧脉在上面微突,下面突起,网脉两面不明显;叶柄长5—10毫米,无毛。伞形花序单生叶腋,花序梗长,纤细,长5—7毫米,被柔毛或近无毛;每一雄花序有花3—5朵;花梗短;花被裂片6,有时3或4,宽卵形或近圆形;能育雄蕊9,有时7或12,花丝长1.5—2毫米,有短柔毛;腺体心形,无柄;退化子房卵形,长1—1.5毫米,无毛。果长圆形,长6—7毫米,直径4—4.5毫米,先端有尖头;果托盘状;果梗长约2毫米。花期5月,果期7—8月。