

产湖北、四川、湖南、江西(井冈山)、广西、贵州、云南(马关)。常生于潮湿山坡或山顶混交林中,海拔 1320—2300 米。

Diels 根据四川南川采的雌株标本 (Bock Von Rosthorn 462), 发表了 *Lindera pedunculata* Diels, 1941 年 C. K. Allen 在她的“樟科研究”一文中, 引列了方文培在该地区采的带果标本 (方文培 844, 896) 于该种下, 同时在该文中又根据广西资源县 (钟济新 83503, 模式) 和贵州标本 (A. N. Steward etc. 521) 发表了 *Litsea merrilliana* Allen 一新种, 我们核对了上述标本和详细查阅了 Diels 的原记载及模式产地的大量标本, 发现 *Lindera pedunculata* Diels 与 *Litsea merrilliana* Allen 是同物异名, 而且确系 *Litsea* 属, 因此组合为 *Litsea pedunculata* (Diels) Yang et P. H. Huang.

本种花的雄蕊与花被的数目变化较大, 而且往往不稳定, 有前者增多而后者则减少或后者增多而前者减少的趋向。药室瓣裂也出现有畸形的现象, 不足作为成立属的依据, 故 *Pseudolitsea* Yang 一属予以归并。

38b. 毛红皮木姜子 (变种)

var. *pubescens* Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax Sin. 16(4): 53, pl. 3, f. 4. 1978.

与原变种的区别在于小枝、叶柄、果梗和果序总梗均密被灰黄色短柔毛; 叶先端尾状渐尖。叶上面叶脉具灰黄色短柔毛, 下面被稀疏短柔毛, 沿中脉及侧脉有长柔毛; 果总梗短, 长 2 毫米。

产云南屏边。

39. 海桐叶木姜子 图版 81: 2—6

Litsea pittosporifolia Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax. Sin. 16 (4): 53, f. 11. 1978.

常绿灌木, 高 1.5—3 米。叶芽圆锥形, 鳞片外面被贴伏短柔毛。小枝黄褐色, 先端具棱角, 无毛。叶互生, 椭圆形或间有倒卵形, 长 4—7.5 厘米, 宽 2—3.8 厘米, 先端圆钝, 基部楔形或近圆钝, 上面深绿色, 下面淡绿色或粉绿, 革质, 两面均无毛, 羽状脉, 侧脉每边 7—10 条, 与中脉成 60° 角, 纤细, 近叶缘处消失, 两面微突起, 中脉在上面平或略下陷, 在下面突起; 叶柄长 3—8 毫米, 无毛。伞形花序腋生于枝梢, 单独或 2—3 个集生; 总梗极短或近于无总梗; 苞片 4—5, 外面有贴伏短柔毛, 内面无毛; 每一花序有花 3 朵, 花细小, 淡黄色; 雄花花梗短, 被柔毛; 花被裂片 6, 卵形, 长 1.5 毫米, 宽 1 毫米, 外面中肋有柔毛, 内面无毛; 能育雄蕊 9, 花丝有白色; 腺体肾形, 无柄; 无退化雌蕊。每一果序有果 3 枚; 果序总梗极短, 或几无总梗; 果椭圆形, 长 1.1—1.4 厘米, 直径 5—6 毫米; 果托杯状, 直径 4—5 毫米, 深约 2 毫米, 先端平截; 果梗长约 4 毫米, 被柔毛。花期 7—8 月, 果期 3—4 月。

产广东(鼎湖山)。生于山谷密林湿润处,海拔800—900米。

本种近似豺皮樟 *L. rotundifolia* Hemsl. var. *longifolia* (Nees) Allen, 但小枝、叶片两面、叶柄均无毛;雄花中无退化雌蕊;果椭圆形;果托杯状;果梗长约4毫米,易于区别。

40. 湖南木姜子 图版81: 7—8

Litsea humanensis Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax. Sin. 16 (4): 53, f. 12. 1978.

常绿小乔木,高5米;树皮褐色,平滑,条状剥裂。小枝纤细,褐色,无毛。顶芽卵圆形,鳞片外面被丝状短柔毛。叶互生或于枝顶呈簇生状,倒卵状披针形或披针形,长5—7厘米,宽1—2.5厘米,先端短突尖或渐尖,基部楔形或尖锐,薄革质,上面绿色,下面粉绿色,两面均无毛,羽状脉,侧脉每边6—9条,极纤细,两面均突起,并有明显的网脉,中脉在叶上面下陷,在下面突起;叶柄纤细,长5—6毫米,无毛。果序伞形,生于枝顶叶腋;总梗极短或几无总梗;苞片在结果时仍宿存,外面有短柔毛。果椭圆形,长约1.1厘米,直径6—7毫米;果托盘状,深1.5毫米,直径4—5毫米,全缘或分裂,有柔毛;果梗短,长1—2毫米,先端增粗,有灰黄色柔毛。果期4—5月。

产湖南南部。生于山地密林中。

41. 广东木姜子


Litsea kwangtungensis H. T. Chang 中山大学学报,生物科学专号 1960 (1), 26. 1960.

常绿灌木,高1.5—3米。幼枝灰褐色,无毛。顶芽卵圆形,鳞片外面被丝状短柔毛。叶互生,长圆形或窄长圆形,长4—11.5厘米,宽1—3厘米,先端略尖或钝,基部楔形,革质,上面深绿色,有光泽,下面黄绿色,两面均无毛。羽状脉,中脉在叶上面平或微陷,在下面突起,侧脉每边6—9条,纤细,在叶上面稍明显,在下面稍突起;叶柄长5—7毫米,无毛。伞形花序单生于叶腋,花序总梗极短,略被短柔毛;每一花序有花3—4朵。果椭圆形,长7—8毫米;果托杯状,深3—4毫米,直径4—5毫米,外面略被微柔毛;果梗长约3毫米,略被微柔毛。果期11月。

产广东(从化、增城、龙门)。生于山地密林中,海拔1000米以下。

42. 兰屿木姜子(台湾木本植物志,台湾植物志)

Litsea garciae Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip. 228. 1886; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 216. 1963; C. E. Chang in Fl. Taiwan 2: 439. 1976.——*Litsea kawakamii* Hay. Icon. Pl. Formos. 3: 165. 1913.——*Tetradenia kawakamii* (Hay.) Nemoto ex Makino et Nemoto Fl. Jap. ed 2, 374. 1931.——*Cyliodaphne garciae* (Vidal) Nakai in Bull. Tokyo Sci. Mus. 22: 32. 1948; 刘业经,台湾木本植物志 163. 1972.



1. 西藏木姜子 *Litsea tibetana* Yang et P. H. Huang: 果枝。2—6. 海桐叶木姜子 *L. pittosporifolia* Yang et P. H. Huang: 2. 果枝, 3. 外轮花被片, 4. 内轮花被片, 5. 第一、二轮雄蕊, 6. 第三轮雄蕊。7—8. 湖南木姜子 *L. hunanensis* Yang et P. H. Huang: 7. 果枝, 8. 果实。
(宗维城绘)