

产广东(鼎湖山)。生于山谷密林湿润处,海拔800—900米。

本种近似豺皮樟 *L. rotundifolia* Hemsl. var. *longifolia* (Nees) Allen, 但小枝、叶片两面、叶柄均无毛;雄花中无退化雌蕊;果椭圆形;果托杯状;果梗长约4毫米,易于区别。

40. 湖南木姜子 图版81: 7—8

Litsea humanensis Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax. Sin. 16 (4): 53, f. 12. 1978.

常绿小乔木,高5米;树皮褐色,平滑,条状剥裂。小枝纤细,褐色,无毛。顶芽卵圆形,鳞片外面被丝状短柔毛。叶互生或于枝顶呈簇生状,倒卵状披针形或披针形,长5—7厘米,宽1—2.5厘米,先端短突尖或渐尖,基部楔形或尖锐,薄革质,上面绿色,下面粉绿色,两面均无毛,羽状脉,侧脉每边6—9条,极纤细,两面均突起,并有明显的网脉,中脉在叶上面下陷,在下面突起;叶柄纤细,长5—6毫米,无毛。果序伞形,生于枝顶叶腋;总梗极短或几无总梗;苞片在结果时仍宿存,外面有短柔毛。果椭圆形,长约1.1厘米,直径6—7毫米;果托盘状,深1.5毫米,直径4—5毫米,全缘或分裂,有柔毛;果梗短,长1—2毫米,先端增粗,有灰黄色柔毛。果期4—5月。

产湖南南部。生于山地密林中。

41. 广东木姜子


Litsea kwangtungensis H. T. Chang 中山大学学报,生物科学专号 1960 (1), 26. 1960.

常绿灌木,高1.5—3米。幼枝灰褐色,无毛。顶芽卵圆形,鳞片外面被丝状短柔毛。叶互生,长圆形或窄长圆形,长4—11.5厘米,宽1—3厘米,先端略尖或钝,基部楔形,革质,上面深绿色,有光泽,下面黄绿色,两面均无毛。羽状脉,中脉在叶上面平或微陷,在下面突起,侧脉每边6—9条,纤细,在叶上面稍明显,在下面稍突起;叶柄长5—7毫米,无毛。伞形花序单生于叶腋,花序总梗极短,略被短柔毛;每一花序有花3—4朵。果椭圆形,长7—8毫米;果托杯状,深3—4毫米,直径4—5毫米,外面略被微柔毛;果梗长约3毫米,略被微柔毛。果期11月。

产广东(从化、增城、龙门)。生于山地密林中,海拔1000米以下。

42. 兰屿木姜子(台湾木本植物志,台湾植物志)

Litsea garciae Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip. 228. 1886; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 216. 1963; C. E. Chang in Fl. Taiwan 2: 439. 1976.——*Litsea kawakamii* Hay. Icon. Pl. Formos. 3: 165. 1913.——*Tetradenia kawakamii* (Hay.) Nemoto ex Makino et Nemoto Fl. Jap. ed 2, 374. 1931.——*Cyliodaphne garciae* (Vidal) Nakai in Bull. Tokyo Sci. Mus. 22: 32. 1948; 刘业经,台湾木本植物志 163. 1972.



1. 西藏木姜子 *Litsea tibetana* Yang et P. H. Huang: 果枝。2—6. 海桐叶木姜子 *L. pittosporifolia* Yang et P. H. Huang: 2. 果枝, 3. 外轮花被片, 4. 内轮花被片, 5. 第一、二轮雄蕊, 6. 第三轮雄蕊。7—8. 湖南木姜子 *L. hunanensis* Yang et P. H. Huang: 7. 果枝, 8. 果实。
(宗维城绘)