

常绿乔木。小枝粗壮,近于无毛。叶互生,卵状披针形或倒卵状披针形至披针形,长25—40厘米,宽6—15厘米,先端钝,基部楔形至狭楔形,薄革质,两面均无毛,上面绿色,下面苍绿色,羽状脉,侧脉每边16—20条,直展,纤细,在上面微突,在下面突起,中脉在叶上面扁平,较粗大,近叶基部处宽达4毫米,在下面突起,网脉在两面突起;叶柄粗壮,长1.5—2.5厘米,有沟槽,无毛。伞形花序,花梗粗壮。花未见。果扁球形,长2.2厘米,直径约3厘米,成熟时桔红色;果托杯状,深约7毫米,直径约3厘米;果梗长1.5厘米。果期8—9月。

产我国台湾(兰屿、花莲、台北)。生于常绿阔叶林中。菲律宾也有分布。

43. 栓皮木姜子 图版 86: 4

*Litsea suberosa* Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax. Sin. 16 (4): 54. 1978.

常绿小乔木,高5米;树皮灰色或灰褐色。幼枝灰黄色,无毛或有稀疏毛,老枝灰白色,无毛,具薄的木栓质皮层,皮孔显著。顶芽卵圆形,鳞片外被丝状短柔毛。叶互生,倒披针形或狭长椭圆形,长6—17厘米,宽1.5—5厘米,先端突尖,基部楔形,革质或薄革质,上面深绿色,无毛,下面浅绿色,沿脉有稀疏长柔毛或无毛,羽状脉,侧脉每边13—15条,中脉、侧脉在叶上面平或微陷,在下面突起,小脉稍突起;叶柄长5—1.5毫米,无毛或仅于上面两侧有稀疏柔毛。伞形花序腋生,无总梗或有极短的总梗;苞片4,外面有灰色丝状短柔毛,每一雄花序有花5朵;花梗长2毫米,有丝状柔毛;花被裂片6,卵圆形,外面有丝状柔毛,内面无毛;能育雄蕊9,花丝有长柔毛;腺体小,圆形;无退化雌蕊。果椭圆形,长1—1.2厘米;果托杯状;果梗长3—4毫米,幼时果托外面与果梗均被柔毛。花期7—9月,果期10—11月。

产广东北部、湖南、湖北西部、四川(南川)。生于山坡林中或灌丛中,海拔800—1500米。

本种近黄丹木姜子 *L. elongata* (Wall. ex Nees) Benth. et Hook, f., 但幼枝灰黄色,无毛或有稀疏毛,老枝灰白色,无毛,具木栓质皮层,有皮孔,叶下面沿脉有稀疏柔毛或无毛,小脉稍突起,叶柄无毛或有稀疏长柔毛。

44. 大果木姜子(海南植物志) 毛丹母、青吐木(广东尖峰岭),青吐八角、八角带(海南吊罗山),假椴果 图版 82: 1

*Litsea lancilimba* Merr. in Philip. Journ. Sci. 23: 244. 1923; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 176. 1932 et 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 379. 1938; 海南植物志 1: 290. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 844. 图 1688. 1972.

常绿乔木,高达20米,胸径达60厘米。小枝红褐色,粗壮,具明显棱条,无毛。顶芽卵圆形,先端钝,鳞片外面被丝状短柔毛,边缘无毛。叶互生,披针形,长10—20(50)厘米,宽3.5—5厘米,先端急尖或渐尖,基部楔形,革质,上面深绿色,有光泽,下面粉绿,两



1. 黄丹木姜子(原变种) *Litsea elongata* (Wall. ex Nees) Benth. et Hook. f. var. *elongata*; 果枝。2. 石木姜子 *L. elongata* (Wall. ex Nees) Benth. et Hook. f. var. *faberi* (Hemsl.) Yang et P. H. Huang; 果枝。3. 近轮叶木姜子 *L. elongata* (Wall. ex Nees) Benth. et Hook. f. var. *subverticillata* (Yang) Yang et P. H. Huang; 果枝。4. 栓皮木姜子 *L. suberosa* Yang et P. H. Huang; 果枝。(宗维城绘)