

度等于花被筒2—3倍;果椭圆形,长约2.5厘米,直径1.5厘米;果梗长1—1.5厘米,先端渐增粗,与杯状果托相连,状似漏斗形。花期5月,果期10—11月。

产云南东南部、广西西南部。生于山坡、路旁、沟边疏林或混交林中,海拔800—1900米。越南也有分布。

本种的子房几乎全包于增大的花被筒内,幼果时几乎全包于花被筒内,成熟时果实伸出花被筒外,从这点看,无疑与大萼木姜子 *Litsea baviensis* Lec. 及产自越南的越南木姜子 *L. pierrei* Lec. 关系较近。但本种与大萼木姜子的区别在于花序和果序总梗较长,果托质地薄,较小,深5—8毫米,直径1.3厘米,外面无疣状突起,果顶端不光亮,而且叶片通常较宽。与越南木姜子不同在于花序为伞形,2—5个腋生,果椭圆形,花被筒增大成漏斗状,不为深杯状,叶柄较短。

C. K. Allen 根据 *L. baviensis* Lec. var. *venulosa* Liou 的模式照片将本种归并于 *L. chartacea* (Nees) Hook. f. 中(见 *Ann. Miss. Bot. Gard.* 25: 377. 1938),这显然是不当的,因为后者除花序外,各部均无毛,与前者小枝、叶片下面、叶柄均被毛,显然有别,而且叶形、大小、叶柄粗细、两者也有不同,应予分开。

50. 金平木姜子 图版 83: 1

Litsea chinpingensis Yang et P. H. Huang in *Act. Phytotax. Sin.* 16 (4): 57. f. 15. 1978.

常绿乔木,高10—20米,胸径达20厘米。小枝干时有棱条,黑褐色,嫩时有褐色微毛,后毛脱落变无毛,老枝灰褐色,无毛。顶芽裸露,圆锥形,外被黄褐色短柔毛。叶互生,披针形或窄椭圆形,长8—17厘米,宽2.2—4.2厘米,先端渐尖或短尖,间或钝头,基部楔形,薄革质,上面深绿色,有光泽,下面淡绿色,两面均无毛,羽状脉,侧脉每边7—11条,纤细,两面微突,网脉于两面明显,中脉在上面微陷或微平,在下面突起;叶柄长1—1.8厘米,上面有沟槽,无毛。伞形花序3—4个簇生于叶腋长至2毫米的短枝上;花序梗细长,长约8毫米,疏生褐色短柔毛;每一花序有花4—5朵;花被裂片6,卵形或卵圆形,外部有柔毛,边缘多少有睫毛;退化雄蕊9—12,基部有柔毛;腺体大,三角形,近于无柄;子房卵圆形,花柱粗短,柱头大,盾状,无毛。果椭圆形,长约2.2厘米,直径约1.5厘米;果托盘状,深约2毫米,直径约1厘米;果梗长1.6—2.5厘米,粗壮,直径约3毫米,先端渐增粗达4毫米;果序梗长约1厘米,较粗壮。果期8—9月。

产云南南部及西北部。生于潮湿的阔叶混交林中,海拔1500—2100米。

本种近云南木姜子 *L. yunnanensis* Yang et P. H. Huang, 惟小枝、叶下面、叶柄和花序总梗均无毛,叶片披针形或窄椭圆形,较狭小,两面具显著的网脉,叶柄较短,具沟槽,易于区别。

51. 薄托木姜子

Litsea vang Lec. in *Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris* 5^e Sér. 5: 84.



1. 金平木姜子 *Litsea chinpingensis* Yang et P. H. Huang: 果枝。2—3. 云南木姜子 *L. yunnanensis* Yang et P. H. Huang: 2. 果枝, 3. 幼果。(张泰利仿)