

度等于花被筒2—3倍;果椭圆形,长约2.5厘米,直径1.5厘米;果梗长1—1.5厘米,先端渐增粗,与杯状果托相连,状似漏斗形。花期5月,果期10—11月。

产云南东南部、广西西南部。生于山坡、路旁、沟边疏林或混交林中,海拔800—1900米。越南也有分布。

本种的子房几乎全包于增大的花被筒内,幼果时几乎全包于花被筒内,成熟时果实伸出花被筒外,从这点看,无疑与大萼木姜子 *Litsea baviensis* Lec. 及产自越南的越南木姜子 *L. pierrei* Lec. 关系较近。但本种与大萼木姜子的区别在于花序和果序总梗较长,果托质地薄,较小,深5—8毫米,直径1.3厘米,外面无疣状突起,果顶端不光亮,而且叶片通常较宽。与越南木姜子不同在于花序为伞形,2—5个腋生,果椭圆形,花被筒增大成漏斗状,不为深杯状,叶柄较短。

C. K. Allen 根据 *L. baviensis* Lec. var. *venulosa* Liou 的模式照片将本种归并于 *L. chartacea* (Nees) Hook. f. 中(见 *Ann. Miss. Bot. Gard.* 25: 377. 1938),这显然是不当的,因为后者除花序外,各部均无毛,与前者小枝、叶片下面、叶柄均被毛,显然有别,而且叶形、大小、叶柄粗细、两者也有不同,应予分开。

50. 金平木姜子 图版 83: 1

Litsea chinpingensis Yang et P. H. Huang in *Act. Phytotax. Sin.* 16 (4): 57. f. 15. 1978.

常绿乔木,高10—20米,胸径达20厘米。小枝干时有棱条,黑褐色,嫩时有褐色微毛,后毛脱落变无毛,老枝灰褐色,无毛。顶芽裸露,圆锥形,外被黄褐色短柔毛。叶互生,披针形或窄椭圆形,长8—17厘米,宽2.2—4.2厘米,先端渐尖或短尖,间或钝头,基部楔形,薄革质,上面深绿色,有光泽,下面淡绿色,两面均无毛,羽状脉,侧脉每边7—11条,纤细,两面微突,网脉于两面明显,中脉在上面微陷或微平,在下面突起;叶柄长1—1.8厘米,上面有沟槽,无毛。伞形花序3—4个簇生于叶腋长至2毫米的短枝上;花序梗细长,长约8毫米,疏生褐色短柔毛;每一花序有花4—5朵;花被裂片6,卵形或卵圆形,外部有柔毛,边缘多少有睫毛;退化雄蕊9—12,基部有柔毛;腺体大,三角形,近于无柄;子房卵圆形,花柱粗短,柱头大,盾状,无毛。果椭圆形,长约2.2厘米,直径约1.5厘米;果托盘状,深约2毫米,直径约1厘米;果梗长1.6—2.5厘米,粗壮,直径约3毫米,先端渐增粗达4毫米;果序梗长约1厘米,较粗壮。果期8—9月。

产云南南部及西北部。生于潮湿的阔叶混交林中,海拔1500—2100米。

本种近云南木姜子 *L. yunnanensis* Yang et P. H. Huang, 惟小枝、叶下面、叶柄和花序总梗均无毛,叶片披针形或窄椭圆形,较狭小,两面具显著的网脉,叶柄较短,具沟槽,易于区别。

51. 薄托木姜子

Litsea vang Lec. in *Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris* 5^e Sér. 5: 84.

1913; et in Fl. Gén. Indochine 5: 139. 1914.

51a. 薄托木姜子(原变种)

var. *vang*

果托边缘全缘。产越南、柬埔寨及老挝。我国不产。

51b. 沧源木姜子(变种)

var. *lobata* Lec. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 5^e Sér. 5: 84. 1913; et Fl. Gén. Indochine 5: 139. 1914. — *Litsea pierreii* Lec. var. *lobata* (Lec.) Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 382. 1938.

常绿乔木,高18米。小枝灰褐色,有细纵条纹,幼时具灰黄色微柔毛,老时毛脱落变无毛。顶芽裸露,被灰黄色短柔毛。叶互生,椭圆形,长11.5—17厘米,宽4—6厘米,先端渐尖或短尖,基部宽楔形或略圆,革质,上面绿色,下面淡绿色,两面均无毛,羽状脉,侧脉每边5—7条,弧曲伸展,纤细,中脉、侧脉在两面均突起,两面横脉网结明显;叶柄长1.2—1.5厘米,幼时被灰黄色微柔毛,老时毛脱落全全无毛。花未见。果序伞形,单生或2个生于枝侧;每一果序梗长1—1.5厘米,直径约2毫米,颇粗壮,有果1—3;果椭圆形,长2—2.5厘米,直径1.3—1.5厘米,成熟时黑色;果托深杯状,直径2—2.5厘米,深1.5—2厘米,外面具多数近圆形皮孔,果托边缘3—4裂,裂片大,不规则;果梗长1—1.5厘米,颇粗壮,直径2—3毫米。果期5—6月。

产云南西部(沧源)。生于沟谷密林下,海拔800米。柬埔寨也有分布。

C. K. Allen 将 *Litsea vang* Lec. 并入 *L. pierreii* Lec., 我们认为是不妥当,因为前者果实为卵形,而后者果实为扁球形,两者不同,仍予分开。

52. 大萼木姜子(海南植物志) 托壳果(广东海南),白面槁、白肚槁(广东吊罗山),香椒槁(广东海南加积),毛丹、黄槁、红干(广东尖峰岭)

Litsea baviensis Lec. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 5^e Sér. 5: 87. 1913; et Fl. Gén. Indoch. 5: 142. 1914; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 176. 1932 et 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 376. 1938; 海南植物志 1: 290. 1964. — *Litsea maclurei* Merr. in Philip. Journ. Sci. 23: 244. 1923; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 178. 1932 et 1934.

常绿乔木,高达20米,胸径60厘米;树皮灰白色或灰黑色。小枝灰褐色,幼时有柔毛。顶芽裸露,卵圆形,外被黄褐色短柔毛。叶互生,椭圆形或长椭圆形,长11—20(24)厘米,宽3—6.5(7.5)厘米,先端短渐尖或钝,基部楔形,革质,上面深绿色,下面粉绿色,有微柔毛,羽状脉,中脉于叶上面平或微突,在下面突起,侧脉每边7—8条,纤细,于上面略下陷,下面明显突起,小脉不甚明显;叶柄长1—1.6厘米,稍粗壮。伞形花序常几个簇生一起,腋生短枝上,短枝长2—3毫米,被柔毛;苞片卵形,长4毫米,外面有黄褐色微柔毛;花梗短,被柔毛;花被裂片6,宽卵形,外面有短柔毛,边缘有睫毛;能育雄蕊9,花丝有稀疏