

1913; et in Fl. Gén. Indochine 5: 139. 1914.

51a. 薄托木姜子(原变种)

var. *vang*

果托边缘全缘。产越南、柬埔寨及老挝。我国不产。

51b. 沧源木姜子(变种)

var. *lobata* Lec. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 5^e Sér. 5: 84. 1913; et Fl. Gén. Indochine 5: 139. 1914.——*Litsea pierreii* Lec. var. *lobata* (Lec.) Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 382. 1938.

常绿乔木,高18米。小枝灰褐色,有细纵条纹,幼时具灰黄色微柔毛,老时毛脱落变无毛。顶芽裸露,被灰黄色短柔毛。叶互生,椭圆形,长11.5—17厘米,宽4—6厘米,先端渐尖或短尖,基部宽楔形或略圆,革质,上面绿色,下面淡绿色,两面均无毛,羽状脉,侧脉每边5—7条,弧曲伸展,纤细,中脉、侧脉在两面均突起,两面横脉网结明显;叶柄长1.2—1.5厘米,幼时被灰黄色微柔毛,老时毛脱落全全无毛。花未见。果序伞形,单生或2个生于枝侧;每一果序梗长1—1.5厘米,直径约2毫米,颇粗壮,有果1—3;果椭圆形,长2—2.5厘米,直径1.3—1.5厘米,成熟时黑色;果托深杯状,直径2—2.5厘米,深1.5—2厘米,外面具多数近圆形皮孔,果托边缘3—4裂,裂片大,不规则;果梗长1—1.5厘米,颇粗壮,直径2—3毫米。果期5—6月。

产云南西部(沧源)。生于沟谷密林下,海拔800米。柬埔寨也有分布。

C. K. Allen 将 *Litsea vang* Lec. 并入 *L. pierreii* Lec., 我们认为是不妥当,因为前者果实为卵形,而后者果实为扁球形,两者不同,仍予分开。

52. 大萼木姜子(海南植物志) 托壳果(广东海南),白面槁、白肚槁(广东吊罗山),香椒槁(广东海南加积),毛丹、黄槁、红干(广东尖峰岭)

Litsea baviensis Lec. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 5^e Sér. 5: 87. 1913; et Fl. Gén. Indoch. 5: 142. 1914; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 176. 1932 et 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 376. 1938; 海南植物志 1: 290. 1964.——*Litsea maclurei* Merr. In Philip. Journ. Sci. 23: 244. 1923; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 178. 1932 et 1934.

常绿乔木,高达20米,胸径60厘米;树皮灰白色或灰黑色。小枝灰褐色,幼时有柔毛。顶芽裸露,卵圆形,外被黄褐色短柔毛。叶互生,椭圆形或长椭圆形,长11—20(24)厘米,宽3—6.5(7.5)厘米,先端短渐尖或钝,基部楔形,革质,上面深绿色,下面粉绿色,有微柔毛,羽状脉,中脉于叶上面平或微突,在下面突起,侧脉每边7—8条,纤细,于上面略下陷,下面明显突起,小脉不甚明显;叶柄长1—1.6厘米,稍粗壮。伞形花序常几个簇生一起,腋生短枝上,短枝长2—3毫米,被柔毛;苞片卵形,长4毫米,外面有黄褐色微柔毛;花梗短,被柔毛;花被裂片6,宽卵形,外面有短柔毛,边缘有睫毛;能育雄蕊9,花丝有稀疏

柔毛或近无毛,第3轮基部的腺体小。果椭圆形,长2.5—3厘米,直径1.7—2厘米,顶端平,光亮而滑,中间有1小尖,成熟时紫黑色;果托杯状,厚木革质,状如壳、斗,深1—1.5(2)厘米,直径2.5—3厘米,带灰色,外面有疣状突起;果梗长约3毫米,粗壮。花期5—6月,果期2—3月,但也有在9月采得果实,可能一年内有二次果期。

产广东(海南)、广西(田林)、云南东南部。生于密林中或林中溪旁处,海拔400—2000米。

木材心材边材区别明显,心材黄绿色,干燥后少开裂,不变形,适作家具、细木工、木琴等用材。

本种具大型厚木质状如壳斗的杯状果托,果大,顶端平而光亮平滑,极易识别。

53. 海南木姜子 木姜叶黄肉楠(海南植物志) 图版84

Litsea litseaefolia (Allen) Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax. Sin. 16(4): 57. 1978. — *Actinodaphne litseaefolia* Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 408. 1938; 海南植物志 1: 287. 1964.

常绿灌木或小乔木,高达6米,胸径达10厘米;树皮深褐色。小枝紫褐色,嫩时有灰褐色或黄褐色绒毛,后毛脱落变无毛。顶芽裸露,外面被黄褐色绒毛。叶互生,椭圆形或倒披针状椭圆形,长13—18厘米,宽5.5—7.5厘米,薄革质,先端急尖或近渐尖,基部急尖,上面深绿色,无毛,下面粉绿,疏生短柔毛,羽状脉,侧脉每边10—12条,末端弯拱联接,中脉和侧脉在上面略下陷,下面明显突起,沿脉上毛较密;叶柄长1—1.5厘米,初时有短柔毛,后毛渐脱落变无毛。伞形花序腋生,单独或2—3个集生;苞片4,近圆形,交互对生,外面密被黄褐色丝状短柔毛,内面无毛,开花时仍宿存;每一花序有雄花7朵,花梗短;花被裂片6,长椭圆形,淡绿色,外面被黄褐色丝状短柔毛,内面无毛;能育雄蕊9(10、11、12、13),花丝中下部有长柔毛,第三轮基部的腺体大,具短柄;退化雌蕊瓶状,柱头不明显,无毛;雌花中的退化雄蕊有短柔毛;子房卵圆形,柱头不明显。果椭圆形;果托杯状,果梗粗短。花期5—9月,果期10—11月。

产广东(海南的保亭及万宁)。生于林中或山地疏林中,海拔1400—3400米。

C. K. Allen 发表本种时置于黄肉楠属 *Actinodaphne*, 其实本种的叶为互生,苞片4,交互对生,宿存,应属木姜子属。

本种植物的营养体近似大萼木姜 *L. haviensis* Lec., 其区别在于本种叶脉每边10—12条,而后者通常为7条。

54. 竹叶木姜子(海南植物志) 竹叶松(广东英德),柳叶樟(广东南桥),山古羊(广东海康)

Litsea pseudoelongata Liou, Laur. Chine et Indoch. 179. f. 13. 1932 et 1934; Merr. in Sunyatsenia 1(4): 194. 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 384. 1938; 海南植物志 1: 291. 1964.