

柔毛或近无毛,第3轮基部的腺体小。果椭圆形,长2.5—3厘米,直径1.7—2厘米,顶端平,光亮而滑,中间有1小尖,成熟时紫黑色;果托杯状,厚木革质,状如壳、斗,深1—1.5(2)厘米,直径2.5—3厘米,带灰色,外面有疣状突起;果梗长约3毫米,粗壮。花期5—6月,果期2—3月,但也有在9月采得果实,可能一年内有二次果期。

产广东(海南)、广西(田林)、云南东南部。生于密林中或林中溪旁处,海拔400—2000米。

木材心材边材区别明显,心材黄绿色,干燥后少开裂,不变形,适作家具、细木工、木琴等用材。

本种具大型厚木质状如壳斗的杯状果托,果大,顶端平而光亮平滑,极易识别。

53. 海南木姜子 木姜叶黄肉楠(海南植物志) 图版84

Litsea litseaefolia (Allen) Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax. Sin. 16(4): 57. 1978. — *Actinodaphne litseaefolia* Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 408. 1938; 海南植物志 1: 287. 1964.

常绿灌木或小乔木,高达6米,胸径达10厘米;树皮深褐色。小枝紫褐色,嫩时有灰褐色或黄褐色绒毛,后毛脱落变无毛。顶芽裸露,外面被黄褐色绒毛。叶互生,椭圆形或倒披针状椭圆形,长13—18厘米,宽5.5—7.5厘米,薄革质,先端急尖或近渐尖,基部急尖,上面深绿色,无毛,下面粉绿,疏生短柔毛,羽状脉,侧脉每边10—12条,末端弯拱联接,中脉和侧脉在上面略下陷,下面明显突起,沿脉上毛较密;叶柄长1—1.5厘米,初时有短柔毛,后毛渐脱落变无毛。伞形花序腋生,单独或2—3个集生;苞片4,近圆形,交互对生,外面密被黄褐色丝状短柔毛,内面无毛,开花时仍宿存;每一花序有雄花7朵,花梗短;花被裂片6,长椭圆形,淡绿色,外面被黄褐色丝状短柔毛,内面无毛;能育雄蕊9(10、11、12、13),花丝中下部有长柔毛,第三轮基部的腺体大,具短柄;退化雌蕊瓶状,柱头不明显,无毛;雌花中的退化雄蕊有短柔毛;子房卵圆形,柱头不明显。果椭圆形;果托杯状,果梗粗短。花期5—9月,果期10—11月。

产广东(海南的保亭及万宁)。生于林中或山地疏林中,海拔1400—3400米。

C. K. Allen 发表本种时置于黄肉楠属 *Actinodaphne*, 其实本种的叶为互生,苞片4,交互对生,宿存,应属木姜子属。

本种植物的营养体近似大萼木姜 *L. haviensis* Lec., 其区别在于本种叶脉每边10—12条,而后者通常为7条。

54. 竹叶木姜子(海南植物志) 竹叶松(广东英德),柳叶樟(广东南桥),山古羊(广东海康)

Litsea pseudoelongata Liou, Laur. Chine et Indoch. 179. f. 13. 1932 et 1934; Merr. in Sunyatsenia 1(4): 194. 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 384. 1938; 海南植物志 1: 291. 1964.

常绿小乔木，高达10米；树皮褐色。幼枝灰褐色，有灰色柔毛。顶芽卵圆形，鳞片外面被丝状短柔毛。叶互生，宽条形，长7—12厘米，宽1—1.5厘米，有时达2.5厘米，先端钝尖，基部急尖略下延，薄革质，上面绿色，略有光泽，下面粉绿色，有时带锈黄色，幼时有柔毛，羽状脉，侧脉每边15—20条，在上面不甚明显，下面略突起，中脉在上面下陷，下面突起；叶柄长5—9毫米，初时有柔毛。伞形花序常3—5个簇生在枝顶叶腋短枝上，短枝长5—10毫米，或更短；苞片4—5；每一雄花序有花4朵；花梗短，被柔毛；花被裂片6，有时4或8，卵形或椭圆形，外面有柔毛，内面无毛，有香味；能育雄蕊9，花丝短，有柔毛；腺体长椭圆形，近于无柄；无退化雌蕊。果长卵形，长约1厘米，先端尖；果托浅杯状，直径约4毫米，边缘有圆齿，外面有短柔毛；果梗短，长约2毫米，有灰色柔毛。花期5—6月，果期10—12月。

产广东南部、广西。生于灌木丛中，海拔600—700米。

55. 少脉木姜子

Litsea oligophlebia H. T. Chang 中山大学学报，自然科学专号 1960(1): 25. 1960.

常绿乔木，高13米；树皮褐色。嫩枝褐色，密被黄褐色柔毛。顶芽卵圆形，鳞片外面被丝状短柔毛。叶互生，倒披针形或长圆状倒披针形，长4—10厘米，宽1—2.5厘米，先端渐尖或尖锐，基部楔形，薄革质，上面深绿色，略有光泽，中脉近叶基部有柔毛，下面淡绿色，被柔毛，羽状脉，侧脉每边4—5条，直行向上弯曲，中脉与侧脉在上面下陷，在下面突起，沿脉有长柔毛，平行小脉相距2—3毫米，明显；叶柄长5—8毫米，被黄褐色长柔毛。伞形花序单独或2—4个簇生，无总梗；苞片4，外面被短柔毛，边缘有睫毛；每一雄花序有花5朵；花梗短，被柔毛；花被裂片6，卵状三角形，外面基部有柔毛，内面无毛；能育雄蕊9，花丝细长，基部有疏柔毛；腺体盾状，有柄；无退化雌蕊。未熟果卵圆形，长5—7毫米，直径约4毫米；果托盘状，有柔毛，上面宿存有卵状三角形、先端尖锐的花被裂片；果梗长2毫米，被黄褐色柔毛。花期8—9月，果期5—6月。

产广西南部。生于山谷疏林中，海拔200—300米。

本种叶片倒披针形或长圆状倒披针形，较窄小，侧脉少，中脉、侧脉在叶上面下陷，叶柄、果梗均短，颇易识别。

56. 瑶山木姜子 图版85: 4—6

Litsea yaoshanensis Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax. Sin. 16(4): 58, f. 16: 4—6. 1978.

常绿灌木。小枝褐色，密被灰黄色柔毛。顶芽卵圆形，鳞片外被丝状短柔毛。叶互生，披针形或倒卵状披针形，长5—11.5厘米，宽1—2.5厘米，两端渐狭或基部稍钝，薄革质，上面绿色，有光泽，除中脉有毛外，其余无毛，下面淡绿色，被灰黄色短柔毛，沿脉毛较长，羽状脉，侧脉每边8—10条，纤细，弧曲向上斜展，近叶基处较密，中脉、侧脉在叶上面