

产湖南南部、广东北部。生于疏林中，海拔120—600米。

本种近黄丹木姜子 *L. elongata* (Wall. ex Nees) Benth. et Hook. f., 但叶芽通常生于叶腋或在果序与叶柄之间的叶腋处，叶片椭圆形或倒卵状椭圆形，质较薄，果球形或近球形，直径6毫米；果托盘状，质较薄，果序生于极短的短枝上，容易区别。

60. 绒叶木姜子

Litsea wilsonii Gamble in Sarg. Pl. Wils. 2: 78. 1914; Chun in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China 1 (5): 61. 1925; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 191. 1932 et 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 388. 1938.

常绿乔木，高达10米；树皮褐灰色，光滑。小枝褐色，略粗壮，有灰白色绒毛。顶芽卵圆形，鳞片外被丝状黄色柔毛。叶互生，倒卵形，长5.5—14(18)厘米，宽3—6(9)厘米，先端短突尖，基部渐尖或楔形，革质，幼叶刚发时两面具绒毛，老叶上面深绿色，无毛，下面黄褐色，有灰白色绒毛，羽状脉，侧脉每边6—10条，弯曲斜升至边缘处联结，小脉横走而平行，在叶下面明显，中脉、侧脉在叶上面下陷，下面突起；叶柄长1—3.5厘米，被灰白色绒毛，后毛渐脱落变无毛。伞形花序单生或2—3个集生于叶腋长2—3毫米短枝上；苞片4—6；每一雄花序有花6朵；花序梗长1厘米，花梗长5毫米，均被绒毛；花被裂片6，外面有柔毛；能育雄蕊9，花丝有柔毛，第3轮基部腺体黄色，具短柄。果椭圆形，长1.3厘米，直径7—8毫米，成熟时由红色变深紫黑色；果托杯状，直径5—6毫米，深约3毫米，边缘有不规则裂片；果梗长6—7毫米。花期8—9月，果期5—6月。

产四川、贵州。生于山坡、路旁、灌丛或杂木林中，海拔300—1800米。

61. 台湾木姜子

Litsea hayatae Kanehira, Formos. Trees rev. ed. 217. f. 161. 1936; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 218. 1963.—*Litsea obovata* Hay. in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 30 (1): 252. 1911, non Nees 1848.—*Tetradenia obovata* (Hay.) Nemoto ex Makino et Nemoto, Fl. Jap. ed. 2. 375. 1931.—*Cylicodaphne hayatae* (Kan.) Nakai in Journ. Jap. Bot. 14, 192. 1938.

常绿小乔木。嫩枝密被灰褐色短柔毛。顶芽卵圆形，鳞片外被丝状短柔毛。叶互生，倒卵形至阔长圆形，长15—20厘米，宽8—10厘米，先端圆钝，基部狭楔形，尖锐，革质，上面绿色，除中脉有短柔毛外，其余无毛，下面淡绿色，有灰褐色短柔毛，羽状脉，侧脉每边6—9条，中脉与侧脉在叶上面下陷，在下面突起，连结侧脉之间的平行小脉在下面极显著突起；叶柄长1—2厘米，被灰黄色柔毛。伞形花序腋生，总梗长5毫米或更短，具黄褐色短柔毛；苞片外被丝状短柔毛，每一花序有花5朵；花梗短，被黄褐色长柔毛；花被裂片6，长圆形，外面中部以下有长柔毛；能育雄蕊9(12)，花丝无毛；腺体心形，具柄；雌花中子房长卵圆形，无毛；退化雄蕊无毛。果长椭圆形，长8毫米；果托杯状。花期10—11月。

产我国台湾(台中、嘉义、高雄)。生于常绿阔叶林中，海拔1500—2500米。