

Ho, Laur. Chine et Indoch. 163. 1932 et 1934, in nota; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 369. 1938.

灌木,高 1.8—3 米。枝条纤细,有红色或褐色皮层,开花时无叶但有将伸出的幼叶。伞形花序自落叶的叶腋中生出,具长梗,总梗长 1.5—3.5 厘米;苞片宽,近圆形,外方 2 枚干膜质,淡褐色,全缘,长 0.5—0.6 厘米,内方总苞片色较淡,不久即脱落;花梗有白色丝毛,长 2.5—3 毫米。雄花 8—12 朵组成伞形花序,花被裂片外面基部被丝毛,三脉,内面无毛,长约 3.5 毫米,宽 3 毫米;第一、二轮雄蕊长 2.5 毫米,第三轮雄蕊具二腺体,长 2 毫米。(标本未见,摘自原描写)

L. Diels 发表本种时,称与绢毛木姜子 *L. sericea* (Nees) Hook. f. 为近缘种,唯花序总梗较长(1.5—3.5 厘米)。C. K. Allen 在作“樟科的研究 I”时显然没见到模式标本,但她认为原描写所依据为不成熟的标本,而且把具有长总梗的标本(云南: J. F. Rock 8036, 8126, C. Schneider 4022; 贵州: J. Esquirol 7381; 广西: A. N. Steward & H. C. Cheo 12) 列出认为可能属于本种。从我们所见到的云南西北部总梗较长的标本(丽江: 冯国楣 490, J. F. Rock 8036, 8126) 来看,其幼叶上面有稀疏柔毛,小枝、叶片下面和叶柄均无毛,而花序总梗较原记载略短(长 1—1.9 厘米),但从花的特征和原描写看,疑是红叶木姜子 *L. rubescens* Lec. 或其变种。

68. 浸水营木姜子 佐佐木氏木姜子(台湾植物志)

Litsea sasakii Kamikoti in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa 22: 411. 1931; Kanehira, Formos. Trees 219. 1936; Nakai in Journ. Jap. Bot. 14: 188. 1938; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 218. 1963; C. E. Chang in Fl. Taiwan 2: 448. 1976.——*Fiwa sasaki* (Kamikoti) Nakai in Journ. Jap. Bot. 14: 194. 1938.——*Actinodaphne sasakii* (Kamikoti) Liu & Liao in Sci. Ann. Taiwan Mus. 14: 8. 1971; 刘业经,台湾木本植物志 156. 1972.

小枝密被短柔毛。叶椭圆形或长圆形,长 5—7 厘米,宽 2 厘米,先端锐尖,基部锐尖或楔形,革质,上面无毛,下面沿中脉及侧脉被长硬毛,中脉上面凹陷,下面凸出,侧脉每侧 6—8,小脉近平行,下面显著;叶柄长 0.8—1 厘米,被长硬毛。伞形花序腋生,有花 4 朵;总梗被长硬毛,长约 1 厘米;苞片 4—5,外被绢质微柔毛。雄花:花被筒长 2 毫米,外密被短柔毛;花被裂片 5—6,卵圆形,长 3—3.5 毫米,宽 1.5—2 毫米,外面基部被绢状短柔毛,内面无毛;能育雄蕊 12—14,近等大,花丝长 3—3.5 毫米,有长硬毛,花药长圆形,4 室,室全部内向,第三轮雄蕊长 3.5 毫米,花丝长 1.5 毫米,有腺体,无第四轮退化雄蕊;无退化雌蕊。(标本未见,摘自原描写)

产我国台湾(台东浸水营)。生于中海拔阔叶林中。

Kamikoti 发表本种时,称与红叶木姜子 *L. rubescens* Lec. 近缘,但根据原描写,并非与后者近缘。过去文献,多作存疑种处理,至于是否应归入木姜子属,也有争议,我们

未见标本,附志于此,留待考订。

69. 出蕊木姜子

Litsea dunniana Lévl. in Fedde, Rep. Sp. Nov. 9: 460. 1911; Fl. Kouy-Tchéou 220. 1914; Allen in Journ. Arn. Arb. 17: 329. 1936; et in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 391. 1938.—*Neolitsea* sp. Rehd. in Journ. Arn. Arb. 10: 193. 1929.

小枝、叶柄和叶片下面被黄褐色绒毛。叶生于枝顶,长20—25厘米,宽4厘米,全缘,叶脉多数。花多数,无梗,头状,生于叶腋;苞片近线形,长2厘米,有髯毛;花被裂片长,基部有梗毛;雄蕊显著外露,不等长,药隔很膨大。(标本未见,摘自原描写)

产贵州(安顺)。

A. Rehder 认为是新木姜子属的一种,尔后 C. K. Allen 认为从叶片、花序以及雄蕊的数目来看,仍应属于木姜子属,并进一步指出它与长蕊木姜子 *L. longistaminata* (Liou) Kosterm. 相似,但不同点在于本种叶片下面被细长柔毛,花序无总梗,花丝无毛,花柱被白色毛,而长蕊木姜子叶片下面毛较短,不太显著,花序是由伞形花序组成的一个短总状,花丝有褐色毛,花柱无毛。由于我们尚未看到模式标本或产地模式标本,附记于此,留待考订。

70. 大武山木姜子 李氏木姜子(台湾植物志)

Litsea lii C. E. Chang in Fl. Taiwan 2: 441. 1976.

小乔木。小枝圆柱形,被短柔毛。芽长圆形,被丝毛,锐尖,长6—10毫米,直径2—3毫米。叶长圆形或披针形,长6—9厘米,宽1.3—2.3厘米,先端锐尖,基部锐尖或楔形,革质,上面无毛,下面在中脉基部被长柔毛,侧脉每边约5条,上面稍为突起,下面明显突起,小脉下面明显突起;叶柄纤细,长7—10毫米,被短柔毛。果序腋生,呈伞形;总梗长3毫米。果椭圆形,长3毫米,直径2.5—3毫米,无毛;宿存花被片外面被短柔毛,先端截形;果梗长1—2毫米。(标本未见,摘自原描写)

产我国台湾(屏东大武山)。生于海拔2400米的林中。

张庆恩认为本种近于 *Litsea morrisonensis* Hay. [= 玉山黄肉楠 *Actinodaphne morrisonensis* (Hay.) Hay.], 但不同在于叶近于无毛,小脉在叶下面明显突起,果序有较长的总梗。我们看来,两者区别特征并不明显,况且后者已移入黄肉楠属,因此本种能否建立,若能建立宜置于何属的问题均应加予考虑。由于我们未见标本,附志于此,留待考订。

71. 白鳞木姜子 林氏木姜子(台湾植物志)

Litsea linii C. E. Chang in Fl. Taiwan 2: 443. 1976.

小枝纤细,圆柱形,略被短柔毛。叶披针形,稀倒披针形,长9—15厘米,宽2.5—3.5厘米,先端渐尖,尖头钝,基部楔形,薄革质,上面无毛,下面沿脉有长硬毛,全面有白色鳞