

未见标本,附志于此,留待考订。

69. 出蕊木姜子

Litsea dunniana Lévl. in Fedde, Rep. Sp. Nov. 9: 460. 1911; Fl. Kouy-Tchéou 220. 1914; Allen in Journ. Arn. Arb. 17: 329. 1936; et in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 391. 1938.—*Neolitsea* sp. Rehd. in Journ. Arn. Arb. 10: 193. 1929.

小枝、叶柄和叶片下面被黄褐色绒毛。叶生于枝顶,长20—25厘米,宽4厘米,全缘,叶脉多数。花多数,无梗,头状,生于叶腋;苞片近线形,长2厘米,有髯毛;花被裂片长,基部有梗毛;雄蕊显著外露,不等长,药隔很膨大。(标本未见,摘自原描写)

产贵州(安顺)。

A. Rehder 认为是新木姜子属的一种,尔后 C. K. Allen 认为从叶片、花序以及雄蕊的数目来看,仍应属于木姜子属,并进一步指出它与长蕊木姜子 *L. longistaminata* (Liou) Kosterm. 相似,但不同点在于本种叶片下面被细长柔毛,花序无总梗,花丝无毛,花柱被白色毛,而长蕊木姜子叶片下面毛较短,不太显著,花序是由伞形花序组成的一个短总状,花丝有褐色毛,花柱无毛。由于我们尚未看到模式标本或产地模式标本,附记于此,留待考订。

70. 大武山木姜子 李氏木姜子(台湾植物志)

Litsea lii C. E. Chang in Fl. Taiwan 2: 441. 1976.

小乔木。小枝圆柱形,被短柔毛。芽长圆形,被丝毛,锐尖,长6—10毫米,直径2—3毫米。叶长圆形或披针形,长6—9厘米,宽1.3—2.3厘米,先端锐尖,基部锐尖或楔形,革质,上面无毛,下面在中脉基部被长柔毛,侧脉每边约5条,上面稍为突起,下面明显突起,小脉下面明显突起;叶柄纤细,长7—10毫米,被短柔毛。果序腋生,呈伞形;总梗长3毫米。果椭圆形,长3毫米,直径2.5—3毫米,无毛;宿存花被片外面被短柔毛,先端截形;果梗长1—2毫米。(标本未见,摘自原描写)

产我国台湾(屏东大武山)。生于海拔2400米的林中。

张庆恩认为本种近于 *Litsea morrisonensis* Hay. [= 玉山黄肉楠 *Actinodaphne morrisonensis* (Hay.) Hay.], 但不同在于叶近于无毛,小脉在叶下面明显突起,果序有较长的总梗。我们看来,两者区别特征并不明显,况且后者已移入黄肉楠属,因此本种能否建立,若能建立宜置于何属的问题均应加予考虑。由于我们未见标本,附志于此,留待考订。

71. 白鳞木姜子 林氏木姜子(台湾植物志)

Litsea linii C. E. Chang in Fl. Taiwan 2: 443. 1976.

小枝纤细,圆柱形,略被短柔毛。叶披针形,稀倒披针形,长9—15厘米,宽2.5—3.5厘米,先端渐尖,尖头钝,基部楔形,薄革质,上面无毛,下面沿脉有长硬毛,全面有白色鳞

片,边缘稍内卷,中脉在上面凹陷,下面显著,侧脉每侧5—7,小脉两面显著突起;叶柄长1—1.5厘米,具长硬毛。果序为聚伞状,总梗纤细,长约1.5厘米;果梗长约3毫米,有长硬毛。果长圆形,先端有小突尖头,冠以杯状宿存花被,宿存花被外面有长硬毛。(标本未见,摘自原描写)

产我国台湾(台东大武)。

本种以其叶下面有白色鳞片及其果序有纤细而较长的总梗,极易识别。由于我们未见标本,附志于此,留待考订。

72. 米什米木姜子

Litsea mishmiensis Hook. f. Fl. Brit. India 5: 161. 1886.

大乔木。枝条光滑,带黑色。芽被丝状绒毛。叶互生,长圆状披针形,长10—15.3厘米,宽3.8—5.1厘米,先端长渐尖,基部锐尖,革质,无毛,上面平滑,下面灰褐色,羽状脉,侧脉12—16对,纤细,下面有不规则脉网;叶柄纤细,长1.5—1.75厘米。伞形花序直径0.84—1.27厘米,单生于腋生具叶短枝上,具10—15花;苞片4—5,内凹,革质,早落。雄花花梗长0.42—0.62厘米;花被基部有白色绒毛,花被裂片6,长圆形;能育雄蕊9,第三轮有1对腺体,花丝短而无毛,花药圆形;退化子房小,花柱纤细,柱头小。雌花及果未见。(标本未见,摘自原描写)

产我国西藏南部(米什米山地)。

16. 新木姜子属——*Neolitsea* Merr.

Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. Suppl. 1 (1): 56. 1906; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 139—155. 1932 et 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 415—431. 1938; Kosterm. in Journ. Sci. Res. Indonesia 1: 147. 1952; ——*Tetradenia* Nees in Wall. Pl. Asiat. Rar. 2: 64. t. 176. 1831, non Benth. ——*Litsea* Sect. 3. *Neolitsea* Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 3 (1): 161. 1880.

常绿乔木或灌木。叶互生或簇生成轮生状,很少近对生,离基三出脉,少数为羽状脉或近离基三出脉。花单性,雌雄异株,伞形花序单生或簇生,无总梗或有短总梗;苞片大,交互对生,迟落;花被裂片4,外轮2片,内轮2片。雄花:能育雄蕊6,排成3轮,每轮2枚;花药4室,均内向瓣裂;第一、二轮花丝无腺体,第三轮基部有腺体2;退化雌蕊有或无。雌花:退化雄蕊6,棍棒状,第一、二轮无腺体,第三轮基部有2腺体;子房上位,花柱明显,柱头盾状。果着生于稍扩大的盘状或内陷的果托(花被管)上,果梗通常略增粗。