

4. **长圆叶新木姜子** 柳槁(广东保亭), 番椒槁、红玉李、黑心(广东尖峰岭), 卵槁、鸡卵槁(广东海南), 香桂(广东陵水), 长圆叶新木姜(海南植物志)

Neolitsea oblongifolia Merr. et Chun in Sunyatsenia 2: 234. pl. 45. 1935; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 417. 1938; 海南植物志 1: 296. 1964.

乔木, 高8—10米, 有时达22米, 胸径达40厘米; 树皮灰白、灰而微带褐色或灰黑色, 平滑, 内皮具芳香气味。顶芽单生或2—4个簇生, 鳞片外被锈色柔毛。嫩枝、叶柄、花序均有锈色短柔毛。叶互生, 有时4—6片簇生呈近轮生状, 长圆形或长圆状披针形, 长4—10厘米, 宽0.8—2.3厘米, 先端钝或急尖或略渐尖, 基部急尖, 薄革质, 上面深绿色, 光亮, 下面淡绿色或灰绿, 除中脉在幼时被锈色柔毛外, 两面均无毛, 羽状脉, 中脉在两面均突起, 侧脉每边4—6条, 纤细, 弯曲斜升联结, 在叶上面近于明显, 在下面明显突起, 两面网脉细密显著, 呈蜂窝状小穴; 叶柄长3—7毫米。伞形花序常3—5个簇生叶腋或枝侧, 无总梗; 苞片椭圆状卵形, 长3.5—4毫米; 每一花序有花4—5朵; 花梗长约5毫米, 密被锈色柔毛; 花被裂片4, 卵形, 长1.5—2毫米, 外面被锈色柔毛; 雄花: 能育雄蕊6, 花丝长3毫米, 无毛, 第三轮基部两枚腺体圆形; 雌花: 退化雄蕊条状, 无毛, 子房近圆形, 花柱弯曲, 有黄色短柔毛, 柱头2裂。果球形, 直径8—10毫米, 无毛, 成熟时深黑褐色; 果梗长4—5毫米, 有褐色柔毛, 顶端增粗, 常宿存有4裂的花被片。花期8—11月, 果期9—12月。

产广东(海南)、广西(宁明公母山)。散生于山谷密林中或林缘处, 海拔300—900米。

本种木材纹理通直, 结构细致, 材质硬而稍重, 材色均匀, 易加工, 但干燥后稍开裂, 且稍变形, 可供建筑、家具、农具等用。种子含油率达25—30%, 作工业上用油或照明用油。

5. **锈叶新木姜子** 辣汁树(广东大埔), 石槁(广东鼎湖山), 大叶樟(广东怀集), 白背樟(广西华江), 锈叶新木姜(海南植物志)

Neolitsea cambodiana Lec. in Not. Syst. 2: 335. 1913; in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 5^e Sér. 5: 94. 1913; et Fl. Gén. Indoch. 5: 143. 1914; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 143. 1932 et 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 418. 1938.——*Neolitsea ferruginea* Merr. in Lingnan Sci. Journ. 7: 305. 1929; 海南植物志 1: 295. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 850. 图1700. 1972.

5a. **锈叶新木姜**(原变种) 图版88: 8—10

var. *cambodiana*

乔木, 高8—12米, 胸径10—15厘米; 树皮红褐色, 灰褐色或黑褐色。小枝轮生或近轮生, 幼时密被锈色绒毛。顶芽卵形, 鳞片外面被锈色短柔毛。叶3—5片近轮生, 长圆状披针形、长圆状椭圆形或披针形, 长10—17厘米, 宽3.5—6厘米, 先端近尾状渐尖或突