

10c. 浙江新木姜子(变种) 假桂花, 红皮树, 香桂(浙江) 图版 90: 4

var. *chekiangensis* (Nakai) Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax. Sin. 16(4): 39. 1978. — *N. chekiangensis* Nakai, in Journ. Bot. Jap. 16: 128. 1940.

与原变种不同在于叶片披针形或倒披针形, 较狭窄, 宽 0.9—2.4 厘米, 下面薄被棕黄色丝状毛, 毛易脱落, 近于无毛, 具白粉。

产浙江、安徽、江苏、江西及福建。生于山地杂木林中, 海拔 500—1300 米。

果核可榨油, 供制肥皂和润滑油用, 枝叶可蒸馏芳香油, 作化妆品原料; 树皮民间用来治胃脘胀痛。

10d. 云和新木姜子(变种) 图版 90: 5

var. *paraciculata* (Nakai) Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax. Sin. 16(4): 40. 1978. — *N. paraciculata* Nakai in Fl. Sylv. Kor. 22: 46. 1939, in adnot.

与原变种不同在于幼枝、叶柄均无毛, 叶片通常略较窄, 下面疏生黄色丝状毛, 易脱落, 近于无毛, 具白粉。

产浙江、江西、湖南、广东北部、广西。生于山地杂木林中, 海拔 500—1900 米。

10e. 浙闽新木姜子(变种)

var. *undulatula* Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax. Sin. 16(4): 40. 1978.

与原变种不同在于幼枝、叶柄均无毛, 叶片下面初时被红褐色丝状毛, 老时脱落变无毛, 基部下延, 边缘波状, 透明。

产浙江南部、福建。生于山坡杂木林中。

11. 龙陵新木姜子 狗头骨、三股筋(云南龙陵), 大香果(云南腾冲) 图版 91: 1—2

*Neolitsea lunglingensis* H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. 16(4): 40. pl. 1—2. 1978.

小乔木, 高约 5 米。枝条纤细, 褐色, 初时密被黄褐色微柔毛, 后渐变无毛。顶芽卵圆形, 鳞片外密被金黄色微柔毛。叶互生, 或聚生于枝梢, 椭圆形或椭圆状长圆形, 长 4.5—9 厘米, 宽 1.7—3.5 厘米, 先端突尖, 尖头长约 1 厘米, 基部锐尖, 革质, 上面干时绿褐色或黄褐色, 光亮, 无毛或有时沿中脉略被微柔毛, 下面干时密被贴伏淡黄色但常变黑褐色的绢状长柔毛, 离基三出脉, 侧脉每边约 4 条, 最下一对自叶基 2—5 毫米处发出, 斜展, 伸至叶片上部 2/3 处, 其余侧脉自中脉中部或以上生出, 中脉、侧脉两面突起; 叶柄长 1—2.2 厘米, 密被微柔毛。伞形花序 1—3 个簇生叶腋, 无总梗; 苞片 4, 卵圆形, 外面除边缘无毛外, 其余密被金黄色小柔毛; 每一花序有雄花 5 朵; 花梗长约 4 毫米, 密被金黄色小柔毛; 花被裂片 4, 宽卵圆形, 长 4 毫米, 宽 3 毫米, 外面被金黄色小柔毛, 内面无毛; 能育雄蕊