

4—6 毫米;果托浅盘状,直径约 2 毫米;果梗细,长 5—6 毫米,顶端略增粗。花期 10—11 月,果期 8—9 月。

产广东、广西(宁明公母山)、福建(南靖)。生于混交林中或山谷中。

本种和短梗新木姜子 *N. brevipes* H. W. Li 的小枝均纤细,果梗均细短,在形态上较为近似。惟本种叶质地较厚,上面极其光亮而平滑,边缘无皱折,侧脉每边 2—3 条,而后者叶质地较薄,上面不甚平滑,边缘干时有波状皱褶,侧脉每边 3—4 条,可以区别。

23. 灰白新木姜子

Neolitsea pallens (D. Don) Momiyama et Hara in Journ. Jap. Bot. 47 (9): 269, f. 1. 1972; Koeterm. in Fl. West Pakistan no. 118; 5. 1978.——*Tetranthera pallens* D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 66. 1825.——*Tetradenia consimilis* Nees in Wall. Pl. Asiat. Rar. 2: 64. 1831.——*Litsea consimilis* (Nees) Nees, Syst. Laur. 628. 1836.——*L. umbrosa* Nees var. *consimilis* (Nees) Hook. f. Fl. Brit. India 5: 180. 1886.

小乔木,高 5—15 米,胸径 10—20 厘米。小枝纤细,褐色或黄褐色,幼时被淡黄褐色短柔毛,老时脱落渐变无毛。顶芽圆卵形,鳞片外面密被淡黄褐色短柔毛。叶互生,或 3—5 片聚生枝端,椭圆形或椭圆状披针形,长 5—8 厘米,宽 2—3 厘米,先端渐尖至尾状渐尖,基部楔形、宽楔形至近圆形,薄革质,边缘干时常呈波状,上面绿色,下面明显灰白色,老时两面无毛,离基三出脉,侧脉每边 4—5 条,最下一对离基部 3—6 毫米处发出,有时向叶缘一侧有极不明显的小支脉,中脉及侧脉两面均突起且常常带红色;叶柄长 0.6—1.5 厘米,被淡黄褐色短柔毛。花未见。果球形,直径约 5 毫米,无毛,先端具小尖头;果托扁平碟状,直径达 3 毫米;果梗纤细,长 (6)10—12 毫米,先端略增大,被淡黄褐色短柔毛。果期 6—7 月。

产西藏南部(聂拉木)、四川(峨眉山?)。生于常绿阔叶林中,海拔 2100—2400 米,为该类型森林中主要树种之一。印度、锡金、尼泊尔、巴基斯坦也有。

24. 短梗新木姜子

Neolitsea brevipes H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. 16 (4): 43. 1978.

小乔木,高 4—10 米,胸径 5 厘米;树皮灰色或灰带褐色。小枝纤细,褐色或黄褐色,幼时密被褐色短柔毛,老时脱落渐变无毛。顶芽圆卵形,鳞片外面密被黄褐色短柔毛。叶互生或 3—5 片聚生枝端,椭圆形或长圆状披针形,间有倒卵状椭圆形,长 6—12 厘米,宽 2—4 厘米,先端尾状渐尖,基部楔形、宽楔形至近圆,薄革质,边缘干时常呈波状,上面绿色,有光泽,除中脉略被微柔毛外,其余无毛,下面粉绿色,初时密被灰黄色柔毛,老时渐变无毛,离基三出脉,侧脉每边 3—4 条,最下一对侧脉离叶基部 3—6 毫米处发出,有时向叶缘一侧有 6—7 条小支脉,中脉与最下一对侧脉在上面明显,微突起,其余侧脉发自中脉中上部,在上面不甚明显,所有脉在下面均突起;叶柄长 5—8 毫米,密被褐色短柔毛。伞形