

花序单生或数个簇生，无总梗；苞片4，外面密被黄色丝状微柔毛；每一花序有花5朵；花梗长1—1.5毫米，密被灰黄色短柔毛；花被裂片4，卵形或卵圆形，长约2毫米，宽1.5毫米，外面中肋有短柔毛；雄花：能育雄蕊6，无毛，第三轮基部腺体圆状心形，具短柄；无退化雌蕊；雌花：退化雄蕊无毛；子房卵圆形，无毛，花柱长1.5毫米，柱头盾状，均无毛。果球形，直径约6毫米；果托扁平碟状，直径2毫米；果梗细短，长3—5毫米，顶端略增粗，幼时被黄褐色短柔毛。 花期12月—1月，果期9—11月。

产云南东南部、广西、广东、福建、湖南。生于山地溪旁、灌丛、疏林或常绿阔叶林中，海拔1380—1680米。印度、尼泊尔也有分布。

25. 变叶新木姜子(台湾植物志) 变叶新木姜(台湾木本植物志)

Neolitsea variabilima (Hay.) Kanehira et Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa 20: 382. 1930; Kanehira, Formos. Trees 227. 1936; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 222. 1963; 刘业经, 台湾木本植物志 162. 1972; C. E. Chang in Fl. Taiwan 2: 456. 1976.—*Tetradenia variabilima* Hay. Icon. Pl. Formos. 3: 167. 1913; 5: 176; f. 61 e 1915.

乔木。小枝干时褐紫色，初时有柔毛，后毛渐脱落变无毛。顶芽单生或2个集生，圆锥形，鳞片外被丝状短柔毛，边缘有时有睫毛。叶互生或聚生枝顶呈轮生状，卵状披针形，倒卵状披针形或长倒卵形，长8—15厘米，宽3—5厘米，先端渐尖，基部楔形或钝，薄革质，上面绿色，有光泽，初时除中脉基部有柔毛外，无毛，下面粉绿，初时稍有贴伏毛，老时无毛，离基三出脉，侧脉每边3—4条，最下一对侧脉离叶基部5毫米处分出，中脉与侧脉在叶上面微突，在下面突起；叶柄长约1厘米，初时有短柔毛。伞形花序2—3个簇生叶腋或枝侧；苞片4，外面被灰色丝状柔毛；每一花序有花4—5朵；花梗长2毫米，密被短柔毛；花被裂片4，披针形，外面有柔毛，内面无毛；雌花具退化雄蕊6，长1.5毫米，无毛，第三轮基部具有柄的腺体；子房卵形，花柱有毛。果椭圆状球形，长8毫米；果梗长约1厘米。

产我国台湾中部。生于阔叶林中，海拔1300—2000米。

26. 南亚新木姜子 南亚新木姜(中国高等植物图鉴)

Neolitsea zeylanica (Nees) Merr. in Philip. Journ. Sci. Suppl. 1: 57. 1906; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 152. 1932 et 1934; 中国高等植物图鉴 1: 851. 图1702. 1972.—*Litsea zeylanica* Nees, Amoen. Bot. Bonn. fasc. 1: 58, pl. 5 (Cinn. Disput.). 1823.—*Tetradenia zeylanica* Nees in Wall. Pl. Asiat. Rar. 2: 64. 1831; 3: 30. 1832.

乔木，高达20米，胸径达36厘米；树皮灰色。幼枝绿色，被黄色微柔毛，老枝深褐色，无毛。叶互生或聚生于枝端，卵状长圆形或长圆形，长7—11厘米，宽2.5—4厘米，先端狭渐尖，基部楔形略下延，革质，上面深绿色，有光泽，无毛，下面粉绿色，幼时沿中脉有黄