

或锈色长柔毛,内面无毛;雄花:能育雄蕊6,花丝基部有柔毛,第三轮基部腺体圆形,小,有短柄,退化雌蕊花柱有毛;雌花:退化雄蕊长1—1.5毫米,基部有柔毛,子房卵形或卵圆形,花柱与子房上端密被柔毛,子房基部无毛。花期2—3月。

产我国台湾中部及南部。

33. 卵叶新木姜子

Neolitsea ovatifolia Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax. Sin. 16 (4): 44. f. 5. 1978.——*Neolitsea phanerophlebia* Merr. f. *glabra* Liou, Laur. Chine et Indoch. 149. 1932 et 1934; Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 430. 1938, p. p. excl. specim. N. K. Chun et C. L. Tso 44292.——*Neolitsea ellipsoidea* Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 428. 1938, p. p. quoad specim. F. C. How 73420.

33a. 卵叶新木姜子(原变种) 图版94: 9—10

var. *ovatifolia*

小灌木。小枝褐色,无毛。叶互生或聚生枝顶近轮生状,卵形,长4—6(8.5)厘米,宽2—2.5(4)厘米,先端渐尖,基部钝圆或宽楔形,革质,上面绿色,下面粉绿,两面均无毛,在扩大镜下或肉眼下可见蜂窝状小穴,离基三出脉,侧脉每边4—5条,最下一对离叶基部2毫米处发出,其余侧脉出自中脉中部或中下部,较纤细,中脉、侧脉在叶两面突起,中脉近叶基部处渐粗壮;叶柄长2—10(15)毫米,略扁平,无毛。伞形花序单生或3—4个簇生,无总梗或有极短的总梗;苞片4,外有贴伏黄色丝状毛,内面无毛;每一花序有雄花5朵,花梗有黄棕色丝状柔毛,花被裂片4,椭圆形,外面中肋有黄棕色丝状柔毛,内面无毛;能育雄蕊6,花丝无毛,第三轮基部的腺体小,圆形,无柄,退化雌蕊无毛,花柱短。果球形或近球形,直径约1厘米,无毛;果梗长5—7毫米,颇粗壮,无毛。果期8月。

产广东、广西。生于山谷疏林中。

刘厚认为本种的模式标本(黄荣焜3221号)与南亚新木姜 *N. zeylanica* (Nees) Merr. 及美丽新木姜 *N. pulchella* (Meissn.) Merr. 关系较近,但由于标本不够完全(果标本),而置于显脉新木姜 *N. phanerophlebia* Merr. f. *glabra* Liou 之下,有待进一步研究。根据我们观察现存的标本和核对黄荣焜3221号标本,本种的特征,与上述种类均有显著的区别,置于上述任何一种的种下,似均不恰当,故另立新种。

33b. 毛柄新木姜子(变种)

var. *puberula* Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax. Sin. 16 (4): 44. 1978.

与原变种不同在于叶基部楔形,叶柄幼时被小柔毛,果梗较长,长7—8毫米。

产云南东南部。生于密林中润湿处,海拔1250米。

34. 香果新木姜子 乌身香檳、香果(广东海南尖峰岭),奉楠(广东海南),香果新木