

Coll. Sci. Univ. Tokyo 30 (1): 248. 1911.——*Tetradenia konishii* (Hay.) Hay. Icon. Pl. Formos. 3: 168. 1913, 5: 174. f. 59a. 1915.

大乔木，胸径达 80 厘米；树皮茶褐色，平滑。小枝无毛。顶芽圆锥形，鳞片外面被丝状短柔毛。叶互生或聚生于枝顶呈轮生状，披针形或长圆形，长 10—15 厘米，宽 3—4 厘米，先端突渐尖，基部楔形，革质，上面深绿色，无毛，有光泽，下面粉绿色，幼时有贴伏柔毛，老时脱落变无毛，离基三出脉，侧脉每边 3 条，最下一对侧脉离叶基部 3—5 毫米处发出，中脉、侧脉在叶两面均突起；叶柄长 1 厘米。伞形花序多个簇生于叶腋或枝侧，无总梗或有极短的总梗；苞片近于圆形，外面被丝状短柔毛；每一花序有花 5—6 朵；雄花梗长 4 毫米，有柔毛，花被裂片 4，卵状披针形，长 4 毫米，外面有柔毛，内面无毛，能育雄蕊 6，长 5.5 毫米，外露，花丝基部有柔毛，第三轮基部的腺体有柄，退化雌蕊无。果卵圆形，长 1.5 厘米，直径 1.2 厘米，成熟时黑色。花期 4—5 月，果期 9—10 月。

产我国台湾。生于常绿阔叶林中，海拔 1500 米。日本(琉球群岛)也有。

木材可供建筑和家具等用。

存 疑 种

44. 大武山新木姜子(台湾植物志)

Neolitsea daibuensis Kamikoti in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa 22: 411. 1932; Kanehira, Formos. Trees rev. ed. 225. 1936; C. E. Chang in Fl. Taiwan 2: 451. 1976.

乔木。幼枝纤细，干时灰白色，无毛。叶芽长卵形，先端钝，鳞片圆钝，覆瓦状排列，外面背部有丝状柔毛。叶互生或聚生于枝顶，卵形或卵状披针形，长 4.5—6.5 厘米，宽 1.5—2.5 厘米，先端渐尖，基部钝或钝楔形，革质，上面有光泽，下面粉绿色，两面皆无毛，离基三出脉，叶上面中脉微突，下面突起，侧脉每边 2—3 条，弧曲，上面基部侧脉不突起，下面微突起，与中脉成 30° 角，至叶顶端消失；叶柄长 1—1.3 厘米，具沟槽，无毛。伞形花序无总梗；每一花序有花 3—5 朵；雄花：花被筒短，外面密被长柔毛；花被裂片 4，窄卵形，长 2.5 毫米，宽 1.5 毫米，先端钝，略相等，外面密被栗褐色柔毛，内面无毛，边缘具栗褐色睫毛；能育雄蕊 6，第一、二轮雄蕊长 4 毫米，花丝长 3 毫米，基部有稀疏柔毛，无腺体，花药长圆形，4 室瓣裂，上 2 室内向，下 2 室侧向，第三轮长 3 毫米，花丝长 2 毫米，基部有稀疏柔毛，腺体膨大，具短柄，花药长圆形，4 室内向；退化子房有柔毛，椭圆状球形，长 0.5 毫米，花柱长 1.5 毫米，密被柔毛，柱头膨大或 2 裂或不规则裂，长 0.5 毫米。雌花及果未见。(标本未见，摘自原描写)

产我国台湾南部。生于山地阔叶林中。

根据本种原记载来看，似与尖叶新木姜子 *N. acuminatissima* (Hay.) Kanehira et Sasaki 相近，因未见标本，附志于此，留待考订。