

长8—10毫米,直径6—7毫米,无毛。花期2—3月,果期8—9月。

产广东、广西。

根膨大部分入药,在广东鼎湖称“台乌球”,可代乌药浸制“台乌酒”,也可作香料及淀粉原料。

28. 假桂钓樟(中国高等植物图鉴) 假桂(广西防城)、河内钓樟(海南植物志)

Lindera tonkinensis Lec. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, 5^e Sér. 5: 112, t. 8. 1913; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 133. 1932 et 1934; Allen in Journ. Arn. Arb. 22: 20. 1941. p. p. 海南植物志 1: 299. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 186, 图 1721. 1972.

28a. 假桂钓樟

var. *tonkinensis*

常绿乔木,高4.5—12米,胸径5—12厘米。小枝圆柱形,具纵向细条纹,绿色,干后变褐色,初时密被褐色微柔毛。叶互生,卵形或卵状长圆形,长8—14厘米,宽2.5—5厘米,先端渐尖,基部楔形或近圆形,常两侧不对称,薄纸质;上面绿色,干时呈绿褐色;下面淡绿色,干时黄绿色,幼时两面沿脉密被锈色微柔毛,老时上面沿中脉被微柔毛或无毛,下面无毛,具三出脉,第一对侧脉直达叶端与第二对侧脉相联处向内折曲,中、侧脉上面稍凹下,下面明显凸起;叶柄长10—15(20)毫米,略被微柔毛。伞形花序(1)2—5集生于叶腋长仅2—3毫米的短枝上,短枝密被锈色微柔毛;每伞形花序具6朵花,雄花序总梗长0.6—1.2厘米,雌花序总梗长0.5—0.6厘米;总苞片6,外面略被微柔毛或近无毛。雄花黄绿色,具梗;花梗倒锥形,长约1毫米,密被锈色柔毛;花被片6,长圆卵形,长约3毫米,宽1.2—1.5毫米,外面仅下部略被柔毛,内面无毛,满布腺点;能育雄蕊9,长2.5毫米,花丝密被长柔毛,第三轮的近基部有2个具短柄的卵状小腺体;退化子房近棒形,长约1毫米,向上渐狭成约1毫米的花柱,柱头盾形,具乳突。雌花淡黄色;花梗长2—2.5毫米,密被锈色柔毛;花被片6,长圆形,长2.5毫米,宽0.7毫米,仅外面下部略被微柔毛;退化雄蕊9,被长柔毛,第三轮的近基部有2个具短柄卵形腺体,无花药;子房卵形,长1.5毫米,宽0.4毫米,无毛,向上渐狭成长达2毫米花柱,柱头盾形,具乳突。果椭圆形,长9毫米,无毛,先端具细尖;果梗长约6毫米,密被锈色柔毛;果托长1—1.5毫米。花期10月至翌年3月,果期5—8月。

产云南东南部、广西南部及广东(海南)。生于山坡疏林及林缘等处,海拔130—800米。越南北部及老挝也有。

种子含油,可供制皂及润滑油用。

28b. 无梗钓樟(变种) 图版 109: 9—12

var. *subsessilis* H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. 16 (4): 66, pl. 4, f. 4. 1978. — *Lindera tonkinensis* auct. non Lec.; Allen in Journ. Arn. Arb. 22: