

绿色,有光泽,下面苍白色,幼时密被棕褐色柔毛,后渐脱落,偶见残存斑块状黑褐色毛片,两面有小凹窝,三出脉,中脉及第一对侧脉上面通常凹下,少有凸出,下面明显凸出;叶柄长0.5—1厘米,有褐色柔毛,后毛被渐脱落。伞形花序腋生,无总梗,常6—8花序集生于一1—2毫米长的短枝上,每花序有一苞片,一般有花7朵;花被片6,近等长,外面被白色柔毛,内面无毛,黄色或黄绿色,偶有外乳白内紫红色;花梗长约0.4毫米,被柔毛。雄花花被片长约4毫米,宽约2毫米;雄蕊长3—4毫米,花丝被疏柔毛,第三轮的有2宽肾形具柄腺体,着生花丝基部,有时第二轮的也有腺体1—2枚;退化雌蕊坛状。雌花花被片长约2.5毫米,宽约2毫米;退化雄蕊长条片状,被疏柔毛,长约1.5毫米,第三轮基部着生2具柄腺体;子房椭圆形,长约1.5毫米,被褐色短柔毛,柱头头状。果卵形或有时近圆形,长0.6—1厘米,直径4—7毫米。花期3—4月,果期5—11月。

产浙江、江西、福建、安徽、湖南、广东、广西、台湾等省区。生于海拔200—1000米向阳坡地、山谷或疏林灌丛中。越南、菲律宾也有分布。

根药用,一般在11月至次年3月采挖,为散寒理气健胃药。果实、根、叶均可提芳香油制香皂;根、种子磨粉可杀虫。

39b. 小叶乌药(变种)(中国高等植物图鉴、广东) 小叶钓樟(海南植物志),细叶乌药、小辣子,立槁辣子(广东),乌药、乌药公(广东、广西) 图版108: 10

var *playfairii* (Hemsl.) H. P. Tsui. in Act. Phytotax. Sin. 16. (4): 69. 1978. — *Lindera playfairii* (Hemsl.) Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 400. et 431. 1938; et in Journ. Arn. Arb. 22: 29. 1941; 海南植物志 1: 299. 1964; 中国高等植物图鉴 1: 859, 图1719. 1927. — *Litsea? playfairii* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 384. 1891. — *Neolitsea playfairii* (Hemsl.) Chun in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China 1(5): 66. 1925; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 143. t. 1932 et 1934. — *Lindera alongensis* Lec. in Nouv Arch. Mus. Hist. Nat. Paris. 5^e Sér. 5: 118. 1913; Liou Ho, Laur. Chine et Indoch. 133. 1932 et 1934.

与原变种的区别在于幼枝、叶及花等被毛较稀疏,且多为灰白色毛或近无毛;叶小,狭卵形至披针形,通常具尾尖,长4—6厘米,宽1.3—2厘米;花也较小。


产广东、广西。生境同原变种。

根药用,消肿止痛,可治跌打,也可代乌药,作散寒理气健胃药,但疗效差。

本变种叶形、毛被程度与原变种有过渡类型。而毛被多少与生态环境也有一定影响,沿海分布的几无毛,向内陆分布的毛较多,故作变种处理。

亚属2. 单花伞序亚属——Subg. *Iteodaphne* (Bl.) Kosterm. in Comm. For, Res. Inst. Bogor 57: 49. 1957; et in Reinwardtia 4: 241. 1957.

伞形花序单花。



1—9. 乌药(原变种) *Lindera aggregata* (Sims) Kosterm. var. *aggregata*: 1. 果枝, 2—3. 不同形状的叶, 4. 根, 5. 花被片, 6—8. 雄蕊, 9. 雌蕊。10. 小叶乌药 *L. aggregata* (Sims) Kosterm. var. *playfairii* (Hemsl.) H. P. Tsui: 果枝。11—14. 天全钓樟 *L. tienchuanensis* Fang et H. S. Kung: 11. 花枝, 12. 花被片, 13. 退化雄蕊, 14. 雌蕊。(吴彩桦绘)