

凹,基部楔形,近革质,上面初时近无毛后无毛,通常光亮,下面色较淡,有密而明显的脉网,羽状脉,侧脉7—10对,在上面十分凹下,下面明显凸起,密被长柔毛;叶柄长5—8毫米,粗壮,被短柔毛。雄伞形花序1—3生于叶腋,无柄;每伞形花序具短总梗;苞片多少宿存,外面在中部有贴生短柔毛。每伞形花序有花6—8朵;花被裂片6(?) (仅见于花期以后)。果近球形,直径约6毫米;果托被短柔毛,略扁平,宽约3毫米;果梗长3.5毫米,被短柔毛,粗壮。

产云南西北部(贡山)。生于海拔约2300米阔叶林中。印度东北部也有。

从所见 C. K. Allen 引证的本种云南标本(俞德浚 20015)来看,本种与绒毛山胡椒 *Lindera nacusua* (D. Don) Merr. 相似,但叶、叶柄、总梗均较长,因未见正常花、果标本,是否属于后种变异范围不好确定,暂存疑。

18. 月桂属——*Laurus* Linn.

Linn. Sp. Pl. 369. 1753; Nees in Wall. Pl. Asiat. Rar. 2: 61.

1831; Meissn. Gen. 327 (239). 1841; et in DC. Prodr. 15 (1);

233. 1864; Benth. in Benth et Hook. f. Gen. Pl. 3: 163. 1880;

Hegi, Fl. Mittl.-Europ. ed. 2, 4 (1): 13. 1958.

常绿小乔木。叶互生,革质,羽状脉。花为雌雄异株或两性,组成具梗的伞形花序;伞形花序在开花前由4枚交互对生的总苞片所包裹,呈球形,腋生,通常成对,偶有1或3个呈簇状或短总状排列。花被筒短,花被裂片4,近等大。雄花有雄蕊8—14,通常为12,排列成三轮,第一轮花丝无腺体,第二、三轮花丝中部有一对无柄的肾形腺体,花丝2室,室内向;子房不育。雌花有退化雄蕊4,与花被片互生,花丝顶端有成对无柄的腺体,其间延伸有一披针形的舌状体;子房1室,花柱短,柱头稍增大,钝三棱形;胚珠1。果卵球形;花被筒不或稍增大,完整或撕裂。

2种,产大西洋的加那利群岛、马德拉群岛及地中海沿岸地区。我国引种栽培有下述1种。

1. 月桂(江苏) 图版115

Laurus nobilis Linn. Sp. Pl. 369. 1753; Hegi, Fl. Mittl.-Europ. ed. 2, 4 (1): 13. 1958; 中国高等植物图鉴 1: 821. 图1642. 1972.

常绿小乔木或灌木状,高可达12米;树皮黑褐色。小枝圆柱形,具纵向细条纹,幼嫩部分略被微柔毛或近无毛。叶互生,长圆形或长圆状披针形,长5.5—12厘米,宽1.8—3.2厘米,先端锐尖或渐尖,基部楔形,边缘细波状,革质,上面暗绿色,下面稍淡,两面无毛,羽状脉,中脉及侧脉两面凸起,侧脉每边10—12条,末端近叶缘处弧形连结,细脉网结,两面多少明显,呈蜂窠状;叶柄长0.7—1厘米,鲜时紫红色,略被微柔毛或近无毛,腹面具槽。花为雌雄异株。伞形花序腋生,1—3个成簇状或短总状排列,开花前由4枚交