

的总梗，花序各部密被灰黄色丝状短柔毛。花被外面密被灰黄色丝状短柔毛，内面毛被较稀，花被筒陀螺状，长约 1.5 毫米，花被裂片卵圆形，长约 1.5 毫米，先端急尖。能育雄蕊 9，长不及 1.5 毫米，花丝被柔毛，花药与花丝近等长，2 室，第一、二轮雄蕊花药药室内向，花丝无腺体，第三轮雄蕊花药药室外向，花丝基部有一对具柄的腺体。退化雄蕊位于最内轮，箭头状长三角形，具柄。子房棍棒状，连花柱长约 1.5 毫米，花柱线形，柱头不明显。果幼时椭圆形，淡绿色，成熟时椭圆球形，长约 17 毫米，直径 10 毫米，赭红色，无毛，有纵棱 12 条。花期 6—10 月，果期 9 月至翌年 3 月。

产广东、广西、江西、福建及浙江等地。生于常绿阔叶林中，海拔 300—750 米（但在广东海南海拔 1800—2400 米）。越南北部也有。

本种木材纹理不很通直，常出现不规则的纵向弯曲，结构细致，材质硬且稍重，加工容易，干燥后稍开裂，并会变形，含油或粘液多，但缺油润的色泽，材色不鲜，易为变色菌侵染，适于作梁、柱、桁、桷、门、窗、农具、一般家具及器具等用材。此外木材刨片浸水所溶出的粘液可作发胶等用，叶尚含樟油。

17. 鸡卵槁(广东海南) 黎厚壳桂(海南植物志) 图版 123: 2—8

*Cryptocarya leiana* Allen in Journ. Arn. Arb. 23: 456. 1942; 海南植物志 1: 284. 1964.


乔木，高 5 米。幼枝纤细，圆柱形，有纵向细条纹，绿褐色，近梢端有暗黄色短柔毛。叶互生，披针形，披针状椭圆形或长椭圆形，极少倒卵圆形，长 (4) 9—14 厘米，宽 1.5—4 (5) 厘米，先端钝或渐尖至钝渐尖，极少微凹，基部楔形，下面粉绿色，有微柔毛，不久变无毛，侧脉每边约 5 条，上面不明显，细脉纤细，密网状，下面明显；叶柄长 5—10 毫米，褐色，无毛，有小腺体。圆锥花序总状式，腋生或近顶生，通常短于叶，长达 6.5 厘米，被细短柔毛，分枝纤细，多少挺直，最末分枝有花 3 朵。花淡黄色，香，长 2—3 毫米，有暗黄色短柔毛，无梗或具短梗，花被裂片卵圆形，长约 2 毫米，内面略被短柔毛。果椭圆球形，长 12 毫米，直径 7 毫米，先端及基部稍收狭，顶端有小凸起，干时紫褐色，带白粉，无毛，有明显的纵棱，果梗稍增厚。花期 9 月，果期 9 月以后。

产广东(海南)。生于村旁灌丛砂质土上。

本种无疑与硬壳桂 *Cryptocarya chingii* Cheng 十分相近，但果特别小，外表晦暗，粗糙，有小疣突，纵棱明显，叶披针状椭圆形或长椭圆形，上半部稍宽，先端钝或微凹或钝渐尖，枝梢生出腋生或近顶生的总状式多花圆锥花序，花的各部分如雄蕊等都较硬壳桂者为大，果梗稍增厚但不及硬壳桂者十分增大。

18. 钝叶厚壳桂(海南植物志) 那果、大叶乌面槁(广东海南)，钝叶桂(两广乔灌木名录) 图版 120: 1—6

*Cryptocarya impressinervia* H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. 17 (2): 70. 1979. — *C. obtusifolia* Merr. in Philipp. Journ. Sci. 21: 344. 1922, non F. V.



1. 红柄厚壳桂 *Cryptocarya tsangii*, Merr.: 果枝。2—8. 鸡卵楠 *C. leiana* Allen: 2. 花枝, 3. 纵剖面, 4. 第一、二轮雄蕊, 5. 第三轮雄蕊, 6. 退化雄蕊, 7. 雌蕊, 8. 果。(吴锡麟绘)