

dantha Hance var. *dunniana* (Lévl.) Kubitzki, 但此号标本植物体除花序外毛被极少, 小叶柄及叶片上面沿中脉稍被短柔毛, 其余光滑无毛, 小叶先端近圆形, 果较小, 翅呈圆形等特征并非红花青藤 *I. rhodantha* Hance var. *dunniana*, 而应为 1 新变种。

6. 蒙自青藤

Illegera henryi W. W. Sm. in Not. Bot. Gard. Edinb. 10: 42. 1917; Kubitzki in Bot. Jahrb. 89: 158. 1969.

高大藤本。茎具槽棱, 初被毛不久变无毛。指状复叶有小叶 3; 叶柄长 6—12 厘米, 无毛。小叶纸质至亚革质, 卵形至椭圆形, 长 8—13 厘米, 宽 5—8 厘米, 先端突尖, 基部近圆形, 两面无毛; 侧脉 4—5 对, 两面隆起, 网脉在下面显著, 小叶柄长 2—3 厘米, 无毛。聚伞花序组成较疏松的圆锥花序, 腋生, 长 5—18 厘米, 密被黄色绒毛; 萼片 5, 长圆形, 长 7—12 厘米, 两面被短柔毛; 花瓣与萼片同形而稍小, 外面被短柔毛; 雄蕊 5, 长约 5—6 毫米, 花丝被疏柔毛; 附属物膜质, 长卵形, 长 3 毫米, 具柄, 背部张口状; 子房下位, 花柱长约 7 毫米, 三棱形, 被长硬毛, 柱头波状扩大成鸡冠状; 花盘上的腺体小, 齿形。果具 4 翅, 径达 12—14 厘米, 2 个小的翅较窄或不育。花期 7 月, 果期 9—11 月。

产云南(东南部)及广西。生于海拔 1100—1600 米密林中。

本种果很大, 直径达 12—14 厘米, 易与其它种区别。

7. 小花青藤 黑九牛(广西), 翅果藤(福建) 图版 127: 1—3

Illegera parviflora Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 38: 296. 1908; Gagnep. in Not. Syst. 3: 363. 1918; et in Lec. Fl. Cén. Indoch. 2: 785. 1920, p. p. quoad specim. Ford. 1002; 海南植物志 1: 303. 1964; Kubitzki in Bot. Jahrb. 89: 177. 1969; et in Fl. Camb. Laos et Vietn. 12: 7. 1970; 中国高等植物图鉴 1: 865. 图 1730, 1972.——*I. appendiculata* auct. non Bl.; King in Journ. Asiat. Soc. Beng. 66: 342. 1897, p. p.; Ridl. in Fl. Mal. Pen. 3: 139. f. 146. 1924.——*I. lucida* auct. non Teysm. et Binn.; Hend. Gard. Bull. S. S. 4: 102. 1926.

藤本。茎具沟棱, 幼枝被微柔毛。指状复叶互生, 具 3 小叶; 叶柄长 4—8 厘米, 无毛。小叶纸质, 椭圆状披针形至椭圆形, 长 7—14 厘米, 宽 3—7 厘米, 先端渐尖至长渐尖, 基部阔楔形, 两侧的偏斜, 两面无毛; 侧脉 5—6 对, 两面明显, 网脉仅在下面明显; 小叶柄长 1.2—2.5 厘米, 无毛。聚伞状圆锥花序腋生, 长 10—20 厘米, 密被灰褐色微柔毛。花绿白色, 两性, 有小苞片; 花萼管顶端缢缩, 密被灰褐色微柔毛; 萼片 5, 绿色, 椭圆状长圆形, 长 5 毫米, 宽 1.5 毫米, 稍被毛; 花瓣与萼片同, 白色, 长 4 毫米, 外面被毛; 雄蕊 5, 长 6—7 毫米, 花丝被微柔毛; 附属物 10, 倒卵状长圆形, 具柄; 子房下位, 花柱长 3.5—4 毫米, 被灰色柔毛, 柱头波状扩大成鸡冠状; 花盘上的腺体 3 裂, 小。果具 4 翅, 径 7—9 厘米, 较大的长 3.5—4.5 厘米, 较小的长 0.5—1 厘米。花期 5—10 月, 果期 11—12 月。

产云南、贵州、广西、广东及福建等省区。生于海拔(350—) 500—1400 米山地密林、