

形,边缘细牙齿状,背部张口状,长 3.5 毫米;子房下位;花盘上的腺体薄。果具 2 翅,长 2.5—3 厘米,翅宽 3.5—4 厘米。花期 8—11 月,果期 1—4 月。(标本未见,摘自原描写)

产云南。生于林中,分布于印度、缅甸、印度尼西亚及马来西亚。海拔 700—1000 米林中,很少达到 1600 米。

13. 尾叶青藤 图版 128: 2—4

*Illigera pseudoparviflora* Y. R. Li in Act. Phytotax. Sin. 17 (2): 77, f. 2: 4—6. 1979.

藤本。茎具棱,光滑无毛。叶指状有小叶 3 枚;叶柄长 4—5 厘米,有条纹,无毛。小叶披针形至阔披针形,先端尾状渐尖,长达 1—1.2 厘米,基部楔形至阔楔形,厚纸质,干后变黑色,长 6—8 厘米,宽 2—2.5 厘米,上面稍有光泽,光滑无毛,下面脉腋被黄褐色长柔毛,侧脉 3—4 对,在上面稍明显,下面十分显著;小叶柄长 0.5—1.2 厘米,沿沟槽被黄褐色短柔毛。聚伞花序组成的圆锥花序腋生和顶生,粗壮,较叶为短,密被黄褐色短柔毛,花序轴长 3—4 厘米。花绿色;萼片长圆形,有 5 条脉,长 6—7 毫米;花瓣与萼片同形,稍短,有 3 条脉;雄蕊 5,长 4.5—5 毫米,在花芽内直立,附属物小而坚实;花柱长 3—4 毫米,密被黄褐色柔毛,柱头波状扩大成鸡冠状;子房下位,密被黄褐色短柔毛,四棱形。果未见。花期 5 月。

产贵州南部(罗甸)。生于山坡路边疏林下。

本种近似小花青藤 *I. parviflora* Dunn; 但花序较粗壮,密被黄褐色短柔毛,雄蕊较花瓣为短,长 4.5—5 毫米,在花芽中直立而有所不同。

14. 短蕊青藤 图版 128: 5—7

*Illigera brevistaminata* Y. R. Li in Act. Phytotax. Sin. 17 (2): 77, f. 1: 2—4. 1979.

藤本。茎灰褐色,无毛,具沟棱。叶为指状 3 小叶;叶柄长 4—6 厘米,无毛。小叶长椭圆形或长卵圆形至阔披针形,近革质,先端尾状渐尖稀突尖,基部圆形至亚圆形,两侧的偏斜,长 6—9 厘米,宽 3—4 厘米,上面橄榄色,光亮,除中脉基部稍被短柔毛外其余平滑无毛,侧脉 3—4(—5) 对,稍显,网脉不显,下面显著隆起,脉腋被淡黄色柔毛;小叶柄长 1—1.5 厘米,上面有小沟,稍被短柔毛。聚伞花序腋生,被稀疏的淡黄色短柔毛,花序轴长约 2 厘米。花绿色;萼片 5,长圆形,长 4—5 毫米;花瓣与萼片同形,近等长;雄蕊 5,长约 2 毫米,粗壮,花丝在芽内直立,药隔上被稀的短柔毛,附属物 10,小而坚实;花柱与花丝等长,约 1 毫米,柱头波状扩大;子房下位,密被淡黄色短柔毛,四棱形。果未见。花期 9 月。

产贵州南部及湖南南部。生于海拔 100—330 米山谷疏林中。

本种与尾叶青藤 *I. pseudoparviflora* Y. R. Li 相似;但小叶为近革质,长椭圆形或卵状椭圆形或阔披针形,长 6—9 厘米,宽 3—4 厘米,基部圆形至亚圆形,雄蕊长约 2 毫米,花丝极短而不同。



1. 圆叶青藤 *L. orbiculata* C. Y. Wu: 果枝。2—4. 尾叶青藤 *L. pseudoparviflora* Y. R. Li: 2. 花枝, 3. 花纵剖面, 4. 雄蕊。5—7. 短蕊青藤 *L. brevistaminata* Y. R. Li: 5. 花枝, 6. 花纵剖面, 7. 雄蕊。(肖溶绘)