

428, 图 755. 1986; 河南植物志 2: 4, 图 715. 1988; 广西植物志 1: 402, 图版 167: 1—3. 1989; 浙江植物志 3: 2, 图 3—2. 1993.

多年生(栽培者常为一年生)草本, 无毛, 植株带蓝灰色。茎直立, 高 30—60 厘米, 明显具纵肋, 分枝多, 开展, 呈二歧状。基生叶数枚, 长 10—30 厘米, 叶柄长, 叶片灰绿色, 多回三出羽状细裂, 裂片形状多变, 线形锐尖、长圆形锐尖或钝、匙状长圆形, 顶生 3 裂片中, 中裂片大多较宽和短; 茎生叶与基生叶同, 但较小和具短柄。花单生于茎和分枝顶端; 花梗长 5—15 厘米, 花托凹陷, 漏斗状或近管状, 长 3—4 毫米, 花开后成杯状, 边缘波状反折; 花萼卵珠形, 长约 1 厘米, 顶端呈短圆锥状, 萼片 2, 花期脱落; 花瓣 4, 三角状扇形, 长 2.5—3 厘米, 黄色, 基部具橙黄色斑点; 雄蕊多数, 约 40 枚以上, 花丝丝状, 基部加宽, 长约 3 毫米; 花药条形, 长 5—6 毫米, 橙黄色; 子房狭长, 花柱短, 柱头 4, 钻状线形, 不等长。蒴果狭长圆柱形, 长达 5—8 厘米, 自花托上脱落后, 2 瓣自基部向上开裂, 具多数种子。种子球形, 直径 1—1.5 毫米, 具明显的网纹。花期 4—8 月, 果期 6—9 月。

原产美国加利福尼亚州。我国广泛引种作庭园观赏植物。

5. 秃疮花属 *Dicranostigma* Hook. f. et Thoms.

Hook. f. et Thoms. Fl. Ind. 1: 255. 1855; Fedde in Engl.

Pflanzenr. 4: 211. 1909; in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. ed.

2/17b: 88. 1936.

草本, 蓝灰色, 被短柔毛或无毛, 常具黄色液汁。根木质, 狭纺锤形。茎圆柱形, 具多数分枝。基生叶多数, 羽状浅裂或深裂或二回羽状分裂, 裂片疏离, 边缘波状或具齿, 具叶柄; 茎生叶互生, 羽状分裂或为不规则的大型粗齿, 无叶柄。花单生或几朵于茎或分枝先端排成聚伞花序; 具花梗, 通常无毛; 无苞片。萼片 2, 卵形或宽卵形, 先端渐尖成距状或为匙形, 无毛或被短柔毛; 花瓣 4, 倒卵形或近圆形, 黄色或橙黄色; 雄蕊多数, 花丝丝状, 花药长圆形, 2 室, 纵裂, 基着; 子房 1 室, 2 心皮, 圆柱形或狭圆柱形, 疏被短柔毛或具瘤状突起, 花柱极短, 柱头头状。蒴果圆柱形或线形, 被短柔毛或无毛, 2 瓣自顶端开裂至近基部。种子小, 多数, 通常卵珠形, 具网纹, 无种阜。

模式种: 莴叶秃疮花 *D. lactucoides* Hook. f. et Thoms.

3 种, 我国均产, 2 种分布于我国西南部至热带以外的喜马拉雅地区, 1 种分布在我国黄土高原。

分种检索表

1. 蒴果圆柱形；花萼外面被毛。

2. 植株高 1—2 米；茎无毛，茎生叶抱茎；蒴果无毛，长 6—8 厘米；子房无毛

..... 1. 宽果秃疮花 *D. platycarpum* C. Y. Wu et H. Chuang

2. 植株高 15—60 厘米；茎被短柔毛，茎生叶不抱茎；蒴果被短柔毛，长 5—6 (—11) 厘米；子房被黄色短柔毛

1. 蒴果线形；花萼外面通常无毛；子房密被疣状短毛..... 3. 秃疮花 *D. leptopodum* (Maxim.) Fedde

1. 宽果秃疮花 (云南植物研究)

Dicranostigma platycarpum C. Y. Wu et H. Chuang in Act. Bot. Yunn. 7 (1): 87, fig. 1. 1985; 西藏植物志 2: 223, 图 75: 1—2. 1985; 横断山区维管植物, 上册; 590. 1993. —*Chelidonium dicranostigma* Prain in Ann. Bot. Gard. Calcutta 9, 2: 7, t. 9. 1901, nom. illegit., non *Chelidonium dicranostigma* Prain in Bull. Herb. Boiss. 3: 585. 1895. —*Dicranostigma lactucoides* Fedde in Engl. Pflanzenr. 4: 211. 1909, p. p. quoad specim. Tibet. austr.; Griens. et D. G. Long Fl. Bhutan 1 (2): 410. 1984, p. p.

草本，高 1—2 米。根狭圆锥形，长 10—15 厘米，顶端粗约 1.5 厘米。茎直立，粗壮，无毛，基部密盖残枯的叶基。基生叶数枚，叶片大头羽状分裂，裂片疏离，具叶柄，柄基部扩大成鞘；下部茎生叶倒披针形或狭倒披针形，长 20—27 厘米，宽 8—14 厘米，大头羽状深裂，裂片 4—6 对，疏离，两侧交互生，边缘为不规则的粗齿，两面无毛，无柄且近抱茎，上部茎生叶宽卵形，向上渐变小，先端渐尖，基部抱茎，边缘为不规则的大型粗齿，齿端通常急尖或钝，两面无毛，侧脉网状，明显。花 1—3 朵于茎和分枝先端排列成聚伞花序；花梗长达 7 厘米，果时达 15 厘米，无毛。花芽宽卵形至近圆形，长约 1.5 厘米，径约 1 厘米；萼片舟状宽卵形，先端急尖并延长成长约 1 厘米的距，外面疏被短柔毛，边缘一侧薄膜质；花瓣倒卵形，长 2—3 厘米，宽 1.2—1.5 厘米，黄色；雄蕊多数，花丝丝状，长 6—10 毫米，花药长圆形，长约 2 毫米；子房圆柱形，长 1—1.5 厘米，粗 2—3 毫米，先端渐狭，无毛，花柱长约 1 毫米，柱头头状，2 裂。蒴果圆柱形，长 6—8 毫米，粗 5—8 毫米，无毛，2 瓣自顶端开裂至近基部。种子卵珠形，长约 1 毫米，具网纹。 花果期 8—9 月。

产云南西北部 (丽江、中甸) 和西藏东南部 (亚东春丕—帕里)，生于海拔 3 300—3 500 (—4 000) 米的高山草地或沟边岩石隙。模式标本采自中甸。

2. 苞叶秃疮花 (中国高等植物图鉴补编)

Dicranostigma lactucoides Hook. f. et Thoms. Fl. Ind. 1: 225. 1855; Fedde in