

柱头头状，4裂，裂片近圆形。蒴果狭圆柱形，长5—10厘米，仅先端疏生刚毛，成熟时通常4瓣自顶端向基部开裂。种子多数，肾形，表面蜂窝状。

产新疆南北各地，生于干旱山坡、沙地和草原。伊朗、中亚、小亚细亚、巴尔干、地中海、高加索及西欧均有分布。

2. 红花疆罂粟 (新拟) 红勒米花 (新疆用译名)，裂叶罂粟 (中国高等植物图鉴补编)

Roemeria refracta (Stev.) DC. Syst. 2: 93. 1821; et Prodr. 1: 122. 1824; Fedde in Engl. Pflanzenr. 4: 243, fig. 32. J—L. 1909; in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. ed. 2/17b: 98, fig. 49. J—L. 1936; Fl. URSS ed. 7: 597. pl. 40. fig. 7. 1963; 新疆植物检索表 2: 336, 图版 13: 6. 1980; 中国高等植物图鉴补编 1: 647, 图 8698. 1982. — *Glaucium refracta* Stev. in litt. ex DC. Syst. 2: 92. 1821.

一年生草本，高20—40厘米。主根圆柱形，垂直，长达8厘米，少分枝。茎直立，圆柱形，具分枝，疏被灰黄色刚毛。基生叶多数，叶片轮廓卵形，长3—8厘米，二回羽状深裂，小裂片线形或线状长圆形，绿色，背面疏被刚毛，叶脉两面均明显；叶柄长3—8厘米，被灰黄色刚毛，基部扩大成鞘；茎生叶同基生叶，但较小和具短柄至近无柄。花单个顶生和腋生，具花梗，花梗长达14厘米，被紧贴、灰黄色刚毛；花芽卵圆形，长1.5—2厘米；萼片卵形，盔状，疏生刚毛；花瓣卵形至近圆形，长2—3厘米，鲜红色，基部约7毫米为暗紫色；雄蕊多数，花丝线形，长约1厘米，花药长圆形，长约1毫米；子房圆柱形，长1—1.8厘米，无毛，花柱短，柱头4裂片，下延。蒴果狭圆柱形，向上渐狭，长4—5厘米，无毛，柱头每2个裂片间具1个刚毛状附属物，附属物内弯并超出柱头，成熟时4瓣自顶端向基部开裂。种子多数，肾形，表面蜂窝状。花果期4—6月。

产新疆伊犁河谷地区，生于海拔860—1100米的山坡荒漠草原草地，或为绿洲地带的杂草。中亚和伊朗有分布。为一开花时红成一片的短命植物。

3. 白屈菜族 CHELIDONIEAE Reichenb.

Handb. 264. 1837; Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. ed. 2/17b: 84. 1936; H. Chuang in Act. Bot. Yunn. 15 (2); 139. 1993.
emend.

花被2基数；雌蕊2心皮；花排列成伞房花序，稀圆锥花序或单花；种子具鸡冠状种阜；果为蒴果。

包括6属。我国有4属。