

8. 金罂粟属 *Stylophorum* Nutt.

Nutt. Gen. Amer. 2: 7. 1818; Fedde in Engl. Pflanzenr. 4: 207.

1909; in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. ed. 2/17b: 86. 1936.

多年生草本，具黄色或血红色液汁。茎1（—3），直立，圆柱形，具条纹，被柔毛或无毛。基生叶少数，具长柄，叶片羽状深裂或全裂，裂片深波状或为不规则的锯齿；茎生叶2—3或4—7枚，具短柄，顶端2叶（稀3叶）近对生，或于总花梗下生出而近于顶生，具短柄或无柄，叶片同基生叶。花排列成伞房状花序或伞形花序，具花序梗和苞片。萼片2，宽卵形，被长柔毛，早落；花瓣4，黄色，近圆形，覆瓦状排列；雄蕊多数（20或更多），花丝丝状，花药长圆形或线状长圆形，2室，纵裂；子房卵球形或圆柱形，被短柔毛，1室，2—4心皮，花柱圆柱形，柱头头状，2—4浅裂，裂片与胎座互生，胚珠多数。蒴果狭卵形或狭长圆形，被短柔毛，2—4瓣自先端向基部开裂，具多数种子。种子小，具网纹和鸡冠状种阜。

模式种：*S. diphyllum* (Michx.) Nutt.

3种，1种产北美大西洋沿岸；我国产2种，分布于四川东部、湖北西部至秦岭。

分种检索表

1. 植株含黄色液汁，被卷曲柔毛；茎生叶4—7枚；柱头裂片小；蒴果长圆形，长2.5—3.5厘米，密被褐色卷曲柔毛 1. 四川金罂粟 *S. sutchuense* (Franch.) Fedde
1. 植株含血红色液汁，无毛；茎生叶2—3枚；柱头裂片大，近平展；蒴果狭圆柱形，长5—8厘米，被短柔毛 2. 金罂粟 *S. lasiocarpum* (Oliv.) Fedde

1. 四川金罂粟（秦岭植物志） 天青地白（陕西） 图版13: 6—7

Stylophorum sutchuense (Franch.) Fedde in Engl. Pflanzenr. 4: 208. 1909; in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. ed. 2/17b: 86. 1936; 秦岭植物志 1 (2): 360, 图307. 1974. ——*Chelidonium sutchuense* Franch. in Morot Journ. de Bot. 8: 293. 1894; Prain in Bull. Herb. Boiss. 3: 581. 1895. ——*Hylomecon* ? *sutchuense* (Franch.) Diels in Engl. Haheb. 29: 353. 1900.

草本，高30—60厘米，具黄色液汁。根茎略粗壮，黑褐色。茎直立或斜上，通常不分枝，密被淡褐色卷曲柔毛。基生叶数枚，叶片轮廓倒长卵形或倒披针形，长10—25厘米，宽4—10厘米，羽状深裂或全裂，裂片4—8对，疏离，卵状披针形或长圆形，长2—5厘米，宽1—2厘米，下部裂片较小，先端钝，基部一侧向上弧曲，另一侧弯缺，边缘为不规则的深圆齿，表面绿色，干后褐色，无毛，背面粉白色，沿脉（尤其