

脉，纵脉自基部向外弧曲上升，至先端汇合，内花瓣长3.5—4.5厘米，花瓣片长2—2.5厘米，宽约3毫米，上半部披针形，下半部长圆形，背部鸡冠状突起高约3毫米，爪线形至条形，长1.5—2厘米；花丝线状披针形，花药狭长圆形，长约2毫米；子房狭椭圆形，长2.5—2.8厘米，中部粗约5毫米，胚珠多数，花柱圆柱形，基部略加粗，向上渐狭，长0.7—1厘米，柱头近提琴状长方形，长约3毫米，四角均突出。蒴果狭椭圆形，长3—4厘米，粗5—7毫米，具宿存花柱。种子近圆形，直径1—1.5毫米，黑色，具光泽。花果期4—7月。

产湖北（建始）、四川南部（雷波、屏山、马边、峨边及大相岭一带）、云南东北部（昭通、绥江、盐津、大关）、西北部（丽江、贡山）和贵州，生于海拔1500—2700米的湿润林下。缅甸北部有分布。模式标本采自建始。

药用镇痛。

15. 紫金龙属* *Dactylicapnos* Wall.

Wall. Tent. Fl. Nepal. 2: 51, t. 39. 1826; Fedde in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. ed. 2/17b: 121. 1936. —*Dicentra*
Subgenus *Dactylicapnos* (Wall.) Stern in Brittonia 13: 44. 1961.

一年生或多年生草质藤本。茎攀援，圆柱形，常有槽。叶多回羽状分裂，顶生小叶卷须状。总状花序或伞房状花序对叶生，有2至数朵花，具草质苞片。花纵向两侧对称；萼片2，鳞片状，早落；花瓣4，黄色，大部合生，外面2枚大，呈兜状，先端变狭，基部囊状，里面2枚较小，提琴形，先端粘合，瓣片倒卵形，背部具鸡冠状突起，爪线形，远长于瓣片；雄蕊6枚，合成2束，与外花瓣对生，雄蕊束下部与花瓣合生，基部各具1蜜腺体并伸入花瓣基部的囊内；子房线形至线状长圆形，1室，胚珠多数，生于2丝状胎座上，花柱纤细，柱头近四方形，上端两角各具1小乳突，基部两侧各具1大乳突。蒴果线状长圆形，常呈念珠状，2瓣裂，或者长卵形，浆果状。种子多数，具种阜。

模式种：紫金龙 *D. thalictrifolia* Wall. = *D. scandens* (D. Don) Hutch.

7种，分布于喜马拉雅地区至我国西部。我国有4种，产西南部。

分种检索表

1. 总状花序7—10花；苞片全缘；萼片卵状披针形，全缘；蒴果浆果状，卵形或长圆状狭卵形；种子

* 《中国高等植物图鉴》作藤铃儿草属，《中国种子植物科属辞典》(1958)作指叶紫茎属。

- 具光泽, 外种皮具乳突 1. 紫金龙 *D. scandens* (D. Don) Hutch.
 1. 总状花序 2—6 花, 伞房状; 苞片边缘流苏状; 萼片线状披针形, 边缘不全缘; 蒴果线状长圆形。
 2. 花大, 长近 2 厘米; 蒴果宽 4—5 毫米, 不呈念珠状; 种子具光泽, 外种皮具细网纹
 2. 宽果紫金龙 *D. roylei* (Hook. f. et Thoms.) Hutch.
 2. 花较小, 长 1.1—1.4 厘米; 蒴果宽不超过 3 毫米。
 3. 蒴果念珠状; 种子具光泽, 外种皮具细网纹
 3. 扭果紫金龙 *D. torulosa* (Hook. f. et Thoms.) Hutch.
 3. 蒴果不呈念珠状; 种子无光泽, 外种皮具乳突
 4. 丽江紫金龙 *D. lichiangensis* (Fedde) Hand.-Mazz.

1. 紫金龙 (云南) 串枝莲、碗豆七、川山七、大麻药 (云南), 藤铃儿草 (中国高等植物图鉴) 图版 17: 9—11

Dactylicapnos scandens (D. Don) Hutch. in Kew Bull. 1921: 105. 1921; Hu in Bull. Fan. Mem. Inst. Biol. 1: 215. 1930; Fedde in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam. ed. 2/17b: 121. 1936; 中国高等植物图鉴 2: 12, 图 1753. 1972; 西藏植物志 2: 244, 图 83: 5—7. 1985; 广西植物志 1: 412. 1991; 横断山区维管植物, 上册: 595. 1993. — *Dielytra scandens* D. Don Prodr. Fl. Nepal. 198. 1825. — *Dactylicapnos thalictrifolia* Wall. Tent. Fl. Nap. 51. pl. 39. 1826. — *Dielytra scandens* (D. Don) G. Don Gen. Syst. 1: 140. 1831. — *Dicentra scandens* (D. Don) Walp. Rep. 1: 118. 1824; Stern in Brittonis 13: 46, fig. 32. 1961; Whitmore in H. Hara et al. Enum. Fl. Pl. Nepal 2: 35. 1979; Griens. et D. G. Long Fl. Bhutan 1 (2): 382. 1984; H. Koba et al. Name List Fl. Pl. Gymnosp. Nepal 171. 1994. — *Dicentra thalictrifolia* (Wall.) Hook. f. et Thoms. Fl. Ind. 1: 273. 1855. — *Corydalis scandens* Franch. in Bull. Soc. Bot. 33: 391. 1886, p. p.; et Pl. Delav. 44. 1889. — *Dicentra schneideri* Fedde Repert. 17: 198. 1921. — *Dactylicapnos multiflora* Hu in Bull. Fan. Mem. Inst. Biol. 1: 214. 1930; in Fedde Repert. 29: 109. 1931.

多年生草质藤本。根粗壮, 木质, 圆柱形, 粗达 5 厘米, 多分枝, 干时外皮呈茶褐色, 木栓质, 有斜向沟纹。茎长 3—4 米, 攀援向上, 绿色, 有时微带紫色, 有纵沟, 具多分枝。叶片三回三出复叶, 轮廓三角形或卵形, 第二或第三回小叶变成卷须; 叶柄长 4—5 厘米; 小叶卵形, 长 0.5—3.5 厘米, 宽 0.4—2 厘米, 先端急尖、钝或圆, 具小尖头, 基部楔形, 两侧不对称, 表面绿色, 有时微带紫色, 背面具白粉, 全缘, 基出脉 5—8, 在背面较明显。总状花序具 (2—) 7—10 (—14) 花; 苞片线状披针形, 长 3—6 毫米, 宽约 1 毫米, 渐尖, 全缘。萼片卵状披针形, 长 2—3 毫米, 宽 1—2 毫米, 全缘, 早落; 花瓣黄色至白色, 先端粉红色或淡紫红色, 外面 2 枚长 1.7—2 厘米, 中部宽 4—6 毫米, 先端向两侧又开, 叉开部分长 3—4 毫米, 基部囊状心形, 囊长 2—3