

脉极细，上部叶裂片渐减和叶柄较短。总状花序顶生，长2—3厘米，有2—4花；苞片轮廓近圆形至宽倒卵形，不规则的深裂或浅裂，或最上部1枚狭倒卵形全缘；花梗细弱，比苞片长2—3倍。萼片小，鳞片状，近圆形，边缘呈不规则的撕裂状；花瓣黄色，上花瓣长2.2—2.5厘米，花瓣片舟状卵形，先端钝，具短尖，背部鸡冠状突起高约1毫米，在花瓣片中部消失，距圆筒形，稍长于花瓣片，略向上弯曲，末端圆，下花瓣匙形，长1.2—1.5厘米，背部鸡冠状突起高约1毫米，边缘具细齿，爪长为花瓣片的1.5—2倍，内花瓣提琴形，长1.1—1.3厘米，花瓣片倒卵形，先端圆，具钝尖头，基部1耳垂，侧边具1囊，爪狭楔形，比花瓣片长；雄蕊束长1—1.2厘米，花药小，花丝狭披针形，蜜腺体贯穿距的1/3；子房狭圆柱形，长0.7—0.8厘米，胚珠数枚，排成1列，花柱比子房短，柱头双卵形，具8个乳突。蒴果狭圆柱形，长约2.5厘米。种子近圆形，直径1—1.5毫米，黑色，极光亮。花果期4—7月。

产云南贡山独龙江流域和碧江，生于海拔1600—1700米的山坡沟边或路旁。缅甸北方（Seinghku谷地）也有。模式标本采自贡山独龙江流域。

本种体态和少花情况均与分布区偏于其西或其南的 *C. leptocarpa* Hook. f. et Thoms. 很相似，或宜作为该种的一个地理亚种，但本种除叶腋有明显抽条芽外，花为黄色。

9. 金钩如意草（滇南本草） 水晶金钩如意草、五味草、水黄连（滇南本草），如意草、断肠草（云南），大理紫堇（中国高等植物图鉴）

*Corydalis taliensis* Franch. Pl. Delav. 48. 1889; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 344. 1931, p. p., excl. syn. *C. bulleyana* et Hand.-Mazz. 4144, Schneider 12205; 中国高等植物图鉴 2: 24, 图 1778. 1972; 补编 1: 667. 1982, in clavi; 云南种子植物名录, 上册: 175. 1984; H. Chuang et C. Y. Wu in Act. Bot. Yunn. 13 (2): 136. 1991, excl. syn. *C. duclouxii* Lévl. et Van. — *Corydalis schochii* Fedde in Fedde Repert. 17: 128. 1921. — *C. pseudasterostigma* Fedde in Fedde Repert. 20: 352, t. 713. 1924; H. Chuang et C. Y. Wu l. c. 135. 1991.

9a. 金钩如意草（原变种） 图版 23: 1—2

var. *taliensis*

无毛草本，高（10—）30—60（—90）厘米。主根增粗，长达30厘米，粗达1厘米，具多数纤细状细根；根茎匍匐，覆盖残枯的叶基。茎1至数条，淡绿带紫色，直立，柔弱，有时平卧，多汁，具分枝和多叶。基生叶数枚，叶柄长3—29厘米，叶片轮廓近圆形或楔状菱形，二至三回三出全裂，第一回全裂片具较长的柄，卵形，第二回裂片具短柄或无柄，宽卵形或先端裂片宽倒卵形，2—3深裂或浅裂，小裂片倒卵形或狭倒卵形，先端钝、圆或截形，表面绿色，背面具白粉，叶脉明显；茎生叶数枚，疏离，与基生叶同形，但叶片较小和叶柄较短。总状花序生于茎和分枝顶端，长2—10厘米，