

- 34a. 会泽紫堇 *C. mairei* Lévl. var. *mairei*
 19. 花较大, 上花瓣长2.3—2.7厘米; 蒴果长1.8—2厘米
 34b. 大花会泽紫堇 *C. mairei* Lévl. var. *megalantha* C. Y. Wu
 18. 茎无毛; 柱头双卵形或稀四方形; 蒴果椭圆形或狭椭圆形。
 20. 柱头双卵形; 花序多花, 顶生, 无或极少侧生叶腋。
 21. 叶片三回三出分裂; 蜜腺体贯穿距的 3/4。
 22. 外花瓣具鸡冠状突起, 距占上花瓣长的 3/5; 花序长 7—10 厘米, 多花, 稀疏;
 苞片不为羽状条裂; 果椭圆形, 长 6—8 毫米
 35. 甘洛紫堇 *C. schusteriana* Fedde
 22. 外花瓣无鸡冠状突起, 距与瓣片近等长; 花序长不逾 3 厘米, 少花, 密集; 苞片
 羽状条裂; 果狭椭圆形, 长约 13 毫米
 36. 粗颈紫堇 *C. crassirhizomata* C. Y. Wu
 21. 叶片三回羽状分裂; 蜜腺体贯穿距的 3/5; 外花瓣无鸡冠状突起, 距等长或稍长于
 瓣片 37. 狭花紫堇 *C. angustiflora* C. Y. Wu
 20. 柱头四方形; 花序 3—6 花, 除顶生的外, 还有数个侧生于叶腋
 38. 假楼斗菜紫堇 *C. aquilegioides* Z. Y. Su
 17. 花白色, 上花瓣长1.7—1.9厘米; 叶片两面具白粉, 干时灰黑色
 39. 粉叶紫堇 *C. leucanthema* C. Y. Wu
 9. 花序伞房状, 少花; 下花瓣中部缢缩, 下部呈囊状; 萼片显著, 不规则的深裂成髯毛状。
 23. 花较粗壮, 外花瓣边缘全缘, 上花瓣鸡冠超出瓣片先端并延伸至距末; 萼片长圆形, 长 2—
 2.5 毫米 40. 假髯萼紫堇 *C. pseudobarbisepala* Fedde
 23. 花较纤细, 外花瓣边缘具不规则的齿裂, 上花瓣鸡冠长为瓣片的 1/3; 萼片卵形或倒卵形,
 长 4—6 毫米 41. 髯萼紫堇 *C. barbisepala* Hand. -Mazz.
 23. 长尖突紫堇 (新拟) 牛尿草 (筠连), 野指甲花 (平武), 断肠草 (什邡、平
 武)

Corydalis pseudomucronata C. Y. Wu, Z. Y. Su et Lidén in Act. Bot. Yunn. 18
 (4): 400. 1996; Z. Y. Su et Lidén in Edinb. J. Bot. 54 (1): 68, Fig. 2b. 1997.

23a. 长尖突紫堇 (原变种)

var. *pseudomucronata*

多年生草本, 高 30—60 (—90) 厘米。须根少, 线形, 具极多纤维状且很长的细
 根, 有时具短主根, 均为黄色; 根茎短, 盖以宿存的叶残基。茎单 1, 直立, 绿色, 有
 时带红色, 具分枝, 疏生叶。基生叶少数, 叶柄长 4—9 厘米, 基部扩大成鞘, 叶片轮
 廓宽卵形, 长 3—5 厘米, 三回羽状分裂, 第一回全裂片 3—4 对, 对生, 具柄, 第二回
 裂片具短柄或无柄, 裂片边缘具不规则的圆齿、缺刻状齿或基部为深裂, 齿端略具尖
 头, 表面绿色, 背面灰绿色; 茎生叶 4—6 枚, 疏离, 互生, 叶柄下部者长达 16 厘米,
 向上渐短, 最上部者长约 1 厘米, 基部多少鞘状宽展, 叶片与基生叶相同, 但向上渐