

90. 弯梗紫堇 (新拟)

Corydalis pseudobalfouriana Lidén et Z. Y. Su in Edinb. J. Bot. **54** (1): 77. 1997.

无毛草本，高 20—25 厘米。须根多数成簇，纺锤状肉质增粗，长 0.5—1.3 厘米，粗 2—4 毫米，先端骤然变狭成细长的柄。茎不分枝，上部具叶，下部裸露，基部变线形。基生叶 1—2 枚，小，叶片 4 全裂，全裂片近圆形；茎生叶 2 枚，互生于茎上部，叶片指状 5 全裂，全裂片披针形。总状花序顶生，有 7—12 花，狭而长；苞片披针形，全缘；花梗粗壮并向下弯曲，花期长 2—4 毫米，果期约 5 毫米，均短于苞片。萼片鳞片状；花瓣鲜蓝色，上花瓣长 2—2.2 厘米，花瓣片舟状卵形，背部具矮鸡冠状突起，距圆筒形，稍长于花瓣片，下花瓣舟状倒披针形，长 0.8—1 厘米，基部具 1 下垂小距，内花瓣长 0.7—0.8 厘米，瓣片倒卵状长圆形，具 1 侧生囊，爪狭楔形，略短于瓣片；雄蕊束长约 6 毫米，花丝狭披针形，蜜腺体贯穿距的 $2/5$ ；子房线形，具多数胚珠，花柱长 1—1.5 毫米，柱头双卵形，上端具 2 乳突。果未见。花期 6 月前后。

产云南西北部 (宁蒗)，生于海拔 3 900—4 250 米的草坡或小石砾坡。模式标本采自宁蒗。

本种是狭域分布的特有种，其花梗短、自梗基下弯 (非从梗顶以锐角直出) 和具长柄的块根而极易识别。

系 2. 小距紫堇系 Ser. Appendiculatae C. Y. Wu et H. Chuang in Act. Bot. Yunn. **6** (3): 237. 1984.

茎生叶二至三回三出分裂或稀三回羽状分裂；花蓝色、紫色或黄色。

系模式种：小距紫堇 *C. appendiculata* Hand. -Mazz.

91. 小距紫堇 (中国高等植物图鉴补编) 雪山一枝蒿、小草乌 (丽江误用名)

图版 48: 1—2

Corydalis appendiculata Hand. -Mazz. Symb. Sin. **7**: 349, tab. VII. Abb. 1—2. 1931; 中国高等植物图鉴补编 **1**: 675, 图 8721. 1982; 云南种子植物名录, 上册: 170. 1984; C. Y. Wu et H. Chuang in Act. Bot. Yunn. **6** (3): 239. 1984; 横断山区维管植物, 上册: 610. 1993.

无毛草本，常多数丛生，高 15—30 厘米。须根多数成簇，纺锤形至长圆状肉质增粗，长 0.5—3 厘米，粗 3—5 毫米，两端渐狭或突然变细，褐色，具长短不等的柄。茎 1—7 条，不分枝或稀上部具 1—2 分枝，上部具叶，下部裸露，基部变细。基生叶 2—5 枚，叶柄纤细，长 4—11 厘米，叶片轮廓圆形，二回三出羽状分裂，小裂片倒卵形，长 5—10 毫米，先端钝，具尖头，基部宽楔形，略下延，叶脉纵向；茎生叶 1—3 枚，互生，具短柄或无柄，叶片轮廓三角形至圆形，下部叶长和宽达 3 厘米，二回三出羽状分裂，小裂片披针形至线形，长 0.5—1.5 厘米，先端急尖，其他同基生叶。总状花序顶