

产四川西南部(盐源、木里、稻城)和云南西北部(丽江、宁蒗、中甸、德钦),生于海拔3 000—4 600米的石灰岩高山灌丛、草甸或流石滩。模式标本采自丽江。

仅在横断山区南段分布的好种。

118. 远志黄堇(西藏植物名录)

Corydalis polygalina Hook. f. et Thoms. Fl. Ind. 1: 263. 1855; in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 123. 1875; Baehni, Bonner et Vautier in Candollea 13: 227. 1951; Ludlow et Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Bot. 5: 49. 1975; T. C. Whitmore in Hara et al. Enum. Fl. Pl. Nepal 2: 34. 1979; C. Y. Wu et H. Chuang in Act. Bot. Yunn. 6 (3): 258. 1984; Griers. et D. G. Long Fl. Bhutan 1 (2): 393. 1984; 西藏植物志 2: 260. 1985; Lidén in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Bot. 18 (6): 490, f. 5 F—G. 6 C. 1989; H. Koba et al. Name List Fl. Pl. Gymnosp. Nepal 138. 1994. ——*Corydalis graminea* Prain Nov. Ind. 143. 1909.

118a. 远志黄堇(原变种)

var. *polygalina*

无毛草本,高10—40厘米。根长,渐狭,明显具柄。茎通常分枝或不分枝,上部具叶,下部裸露,基部变细。基生叶羽状分裂,裂片2—3对,下部裂片3深裂;茎生叶2—4枝,互生于茎上部,近无柄,叶片轮廓宽卵形,长3—6厘米,一回奇数羽状全裂,全裂片(2—)4—6对,疏离,线形,长2—3厘米,通常不分裂或下部裂片3—5裂,具3条纵脉。总状花序顶生和腋生,长3—4厘米,果时延长,有8—15花;苞片最下部者羽状3—5裂,向上裂片渐减,最上部者披针形全缘;花梗通常比苞片长。萼片鳞片状,白色,膜质,具不规则的浅裂;花瓣黄色,具暗紫色的斑点或紫色(据Lidén),上花瓣长1.4—1.6厘米,花瓣片卵形,先端具短尖,背部具淡绿色的矮鸡冠状突起,距圆筒形,与花瓣片近等长或略长,下花瓣倒卵形,长6—7毫米,鸡冠同上瓣,内花瓣提琴形,长6—7毫米,花瓣片先端圆,绿色,具1侧生囊,爪楔形,与花瓣片近等长;雄蕊束长约6毫米,花药长圆形,花丝披针形,蜜腺体贯穿距的1/2;子房狭椭圆形,长约3毫米,花柱长约2毫米,柱头双卵形,上端具2乳突,两侧各具3乳突。蒴果长圆形或狭倒卵形,长5—10毫米,成熟时自果梗基部反折,排列于果轴一侧,具2—5枚种子。花果期6—8月。

产西藏(南木林、加查、错那、丁青),生于海拔4 400—4 900米的山坡、山顶灌丛或石缝中。不丹、锡金和尼泊尔东部有分布。

Lidén曾拟将西藏标本作为亚种,但1994年则认为“或值不得分立”,总之,种下变异较大,且分布区互相交错。

118b. 小花远志黄堇(云南植物研究)(变种)

var. *micrantha* C. Y. Wu in Act. Bot. Yunn. 6 (3): 258. 1984; 西藏植物志