

Sect. *Latiflorae* 亦颇有相似之处, 但后者更特化。

分种检索表

1. 茎无叶或仅具1叶; 叶三回羽状全裂, 末回裂片较长; 花梗细长, 明显长于苞片; 花白色至紫红色, 较小而细瘦; 下花瓣瓣片常反折 135. 多叶紫堇 *C. polyphylla* Hand. -Mazz.
1. 茎疏具2—3叶; 叶二回羽状全裂, 末回裂片较短; 花梗较短, 常隐藏于苞片中; 花蓝色, 常较大而宽展; 下花瓣瓣片不反折 136. 假多叶黄堇 *C. pseudofluminicola* Fedde

135. 多叶紫堇 (西藏植物志) 瑞金巴 (云南中甸) 图版 57: 8—14


Corydalis polyphylla Hand. -Mazz. in Sitzgsanz. Akad. Wiss. Wien. 62: 222. 1925; et Symb. Sin. 7: 346. Taf. 7. Abb. 12. 1931; 中国高等植物图鉴补编 1: 688, 图 8742. 1982; 西藏植物志 2: 296, 1985; 横断山区维管植物, 上册: 614. 1993.

深绿色多年生草本, 高 6—18 厘米。根茎或长或短, 常具匍匐的根茎; 短时较粗, 具肉质须根; 长时较细, 常分枝, 具鳞片, 鳞片长约 5—6 毫米, 卵圆形, 相间约为其长度的 2 倍; 根茎顶端具少数纤细的须根和褐色卵圆形的膜质鳞片, 向上并生多叶和 1—4 茎。茎直立, 不分枝, 近基部或中部常具 1 叶, 稀无叶。基生叶具长柄; 叶柄约与叶片等长或较长; 叶片草质, 卵圆形或近圆形, 长 2—5 厘米, 三回羽状全裂; 一回羽片 3—4 对, 二回羽片通常 2 对, 均具短柄; 三回羽片通常 2 对, 近无柄, 三深裂, 下部的裂达基部, 上部的近基汇合, 裂片椭圆形或披针形, 长 1.5—4 毫米, 急尖。茎生叶与基生叶同形, 着生部位较高时, 叶柄常短于叶片。总状花序粗短, 近伞房状或头状, 具 6—15 花, 宽 3—5 厘米。苞片近长于花梗的 1/2, 下部的叶状, 上部的扇形深裂, 裂片较长。花梗直立伸展, 长 1—2 厘米, 纤细。花白色或紫红色, 平展。萼片绿色, 长约 1/2 毫米, 不明显, 脱落较晚。上花瓣长 1.6—2 厘米, 顶端斜向上升, 鸡冠状突起半圆形, 高 1.5—2 毫米, 近与瓣片的侧翼等宽; 距圆筒形, 约占花瓣全长的 1/3, 直或稍镰形下弯。下花瓣较长, 明显前伸, 瓣片常反折; 爪狭, 向后渐变细。内花瓣具浅鸡冠状突起; 爪楔形, 稍长于瓣片。雄蕊束倒卵状披针形, 上部 1/3 的部位较宽展。子房披针形; 花柱较粗, 长约 3 毫米; 柱头近心形, 上部 2 裂, 具 2 短角状突起。蒴果披针形, 约长 1.2 厘米, 宽 3.5 毫米, 俯垂, 具 2 列种子。

产云南西北部 (贡山、德钦、中甸) 和西藏东部 (察隅), 生于海拔 3 600—4 000 米的阴湿坡地。模式标本采自贡山。

136. 假多叶黄堇 (横断山区维管植物) 拟溪边黄堇 (西藏植物志) 图版 57: 1—7

Corydalis pseudofluminicola Fedde in Fedde Repert. 19: 283. 1924; et in Engl. et



图版 57 1—7. 假多叶黄堇 *Corydalis pseudofluminicola* Fedde: 1. 植株, 2. 花, 3. 上花瓣, 4. 下花瓣, 5. 内花瓣, 6. 雄蕊, 7. 雌蕊。8—14. 多叶紫堇 *C. polyphylla* Hand. Mazz.: 8. 植株, 9. 花, 10. 上花瓣, 11. 下花瓣, 12. 内花瓣, 13. 雄蕊, 14. 雌蕊。(吴锡麟绘)