

粉红色至白色，近平展。萼片近心形，长1.5—2毫米，具啮蚀状齿。外花瓣无鸡冠状突起，瓣片宽展，顶端微凹，稀圆钝或平截，多少具短尖。上花瓣长约2厘米；距长约1厘米，稍下弯；蜜腺体长约7毫米。下花瓣长约1厘米，基部多少具小疣状突起。内花瓣长约8毫米，顶端着色较深，爪长于瓣片。雄蕊束披针形，具中脉。柱头近圆形，具8乳突。蒴果线形，长2—3.7厘米，宽2毫米，多少呈念珠状，具1列种子。种子具小的种阜。

产四川西南部（美姑、洪溪）、云南西北部（德钦、贡山、大理）、西藏东南部（聂拉木、亚东、吉隆、米林），生于海拔3000—4000米的亚高山针叶林林下或空旷草地。锡金、印度、不丹、尼泊尔有分布。模式标本采自锡金。

组 23. 帕里紫堇组 Sect. *Kingiae* C. Y. Wu et Z. Y. Su in Act. Bot. Yunn. 18 (4): 399. 1996.

高海拔高原草本。主根肉质。茎不分枝。疏具1—3叶；基生叶具长柄，茎生叶具短柄至近无柄。总状花序少花。花蓝色至紫色；距常粗大，稍长于瓣片；柱头四方形，较浅，顶端具4乳突。蒴果线状长圆形，下弯。

组模式种：帕里紫堇 *C. kingii* Prain

2种，1变种，均为西藏东南部特有种，似由 Sect. *Flaccidae* 演化而来，适应于高原草原生境的盲枝。

分种检索表

1. 果实无毛；外花瓣鸡冠状突起无齿；叶的裂片通常较狭。
 2. 花较小，长约2厘米 208a. 帕里紫堇 *C. kingii* Prain var. *kingii*
 2. 花较大，长约2.8厘米
 - 208b. 大花帕里紫堇 *C. kingii* var. *megalantha* C. Y. Wu et Z. Y. Su
1. 果实密被乳突状短柔毛；外花瓣具短齿状鸡冠突起
 - 209. 毛果紫堇 *C. lasiocarpa* Lidén et Z. Y. Su

208. 帕里紫堇（西藏植物志）

Corydalis kingii Prain in Journ. As. Soc. Beng. 65 (2): 30. 1896; et Nov. Ind. 10: 150. 1905; Griers. et D. G. Long, Fl. Bhutan 1 (2): 389. 1984; 西藏植物志 2: 284. 1985.

208a. 帕里紫堇（原变种） 图版 85: 1—5

var. *kingii*

多年生灰绿色草本，高15—30厘米。主根肉质，长4—6厘米，粗5—8毫米，不