

分枝或分枝。茎 1 至多条，发自基生叶腋，不分枝或少分枝，疏具 1—3 叶。基生叶少数，长约 7—9 厘米，叶柄约与叶片等长；叶片上面绿色，下面灰绿色，二回羽状全裂，一回羽片 5—7 枚，对生，具短柄，二回羽片 3—5 枚，近无柄，二回三深裂，末回裂片倒卵状披针形，约长 4—5 毫米，宽 2 毫米，多少具短尖。茎生叶与基生叶同形，具短柄至近无柄。总状花序密具多花，果期渐疏离。苞片披针形，全缘，下部的约长 6 毫米，宽 3—4 毫米，上部的较小。花梗长约 1 厘米。花紫红色至粉红色。萼片斜心形，长约 2 毫米，全缘或下半部具疏齿，上半部常带紫红色。外花瓣渐尖，背部具全缘的鸡冠状突起，瓣片侧面多少弧形下凹，下半部具耳状突起。上花瓣长约 2 厘米；距圆筒形，稍长于瓣片，宽约 3 毫米；蜜腺体约贯穿距长的 3/5。下花瓣长约 1.2 厘米，稍向前伸出，基部具小瘤状突起。内花瓣长约 9 毫米，爪长于瓣片。雄蕊束披针形，具 3 纵肋。柱头扁四方形，基部不下延，顶端具 4 短柱状乳突。蒴果线形，长约 2 厘米，具 1 列种子。种子近圆形，直径约 1 毫米；种阜帽状，紧贴种子。

产西藏中部和南部（亚东春丕、墨竹工卡、拉孜、定日、拉萨、加查、南木林、昂仁、旁多河），生于海拔 3 300—4 800 米左右的山坡、草甸或石隙中。模式标本采自亚东的帕里。

208b. 大花帕里紫堇（变种） 结巴铜达（藏语）

var. *megalantha* C. Y. Wu et Z. Y. Su in Act. Bot. Yunn. **18** (4): 404. 1996.

与原变种的区别是花较大，长约 2.8 厘米，距较粗，宽约 4—5 毫米。

产西藏中部（拉萨至察日）。模式标本采自拉萨至察日。

藏药，用于止血。

209. 毛果紫堇 图版 86: 1—3

Corydalis lasiocarpa Lidén et Z. Y. Su in Edinb. J. Bot. **54** (1): 82, Figs. 4b, 5B, 1997.

根未见。茎高 30—40 厘米或更高，上部具 3—4 叶，分枝。下部的叶长 4—8 厘米，宽 2.5—7 厘米，三角状卵圆形，具短柄，近二回羽状全裂，一回羽片具短柄，二回羽片无柄，全缘或多少分裂成具短尖的卵圆形裂片。上部的叶较小，无柄。总状花序不分枝或近分枝，具 13—22 花，密集，果期伸长。苞片长 3—4 毫米，卵圆形，多少具齿。花梗直立，纤细，长 5—10 毫米，果期伸长达 10—20 毫米。花淡紫红色，平展。萼片卵圆形，渐尖，具齿。外花瓣具短齿状鸡冠，顶端渐尖，具突出的侧生裂瓣或耳状体。上花瓣长 2—2.2 厘米；距粗壮，圆筒形，轻微向下弯曲，长约 9 毫米；蜜腺稍超过距长的 1/2。下花瓣基部具小囊，爪较宽。内花瓣长 1—1.1 厘米；爪线形，长约 7 毫米。柱头近四方形，宽度大于长度，顶端具 2 大的三角形乳突和不明显的侧生乳突。蒴果线形，密被乳突状微柔毛。