

313.1831.——*L. campestre* auct. non R. Br., Liou et al. 东北植物检索表 114. 1959. ——  
*L. cordatum* auct. non Willd. ex Stev.; Liou et al. l. c. 112. 图版 58. 图 2. 1959.

一年或二年生草本,高 20—50 厘米,植株无毛或近无毛,绿色;茎单一,直立,上部分枝或不分枝。基生叶长圆形或匙状长圆形,长 5—7 厘米,全缘或大头羽状半裂,果期枯萎;叶柄长 5—7 厘米;茎生叶长圆形或三角状长圆形,长 1.5—3 厘米,顶端急尖或圆钝,基部箭形,抱茎,边缘疏生波状小齿。总状花序果期延长;萼片椭圆形,长约 1.5 毫米;花瓣白色,倒卵状楔形,长约 2.5 毫米,有爪;雄蕊 6。短角果宽卵形,长 5—6 毫米,上部边缘有翅,顶端微缺,果瓣粗糙,具鳞片状乳突,花柱和凹缺等长或超出;果梗长 4—6 毫米。种子宽卵形,长约 1.5 毫米,棕色,无翅,有突起。花期 5 月,果期 6 月。

产辽宁(大连市),为外来植物。生在山坡。分布于欧洲及小亚细亚,传播至美洲。模式标本采自欧洲。

组 2. 具瓣组——Sect. **Cardamon** DC. l. c. 533. 1821 et l. c. 204. 1824; O. E. Schulz l. c. 408. 1936.

仅 1 种: 家独行菜 *L. sativum* L., 栽培或逸为野生。

2. 家独行菜(东北植物检索表) 台尔台孜(维吾尔名) 图版 9:1—4

***Lepidium sativum*** L. Sp. Pl. 644. 1753; Boiss. Fl. Orient. 1: 354. 1867; Hook. f. et T. Anders. Hook. f. in Fl. Brit. Ind. 1: 59. 1872; Thell. in Neue Denksch. Schweiz. Gesell. Naturw. 41: 121. 1906; N. Busch in Kom. Fl. URSS 8: 508. 1939; Hedge in Davis, Fl. Turk. 1: 281. 1965 et in Rechinger, Fl. Iran. 57: 64. 1968; 东北植物检索表 114. 图版 28. 图 8. 1959; 东北草本植物志 4: 60. 图版 34. 1980.


一年生草本,高 20—40 厘米;茎单一,直立,有分枝,无毛,常具蓝灰色粉霜。基生叶倒卵状椭圆形,一回或二回羽状全裂或浅裂,少数仅有锯齿;茎生叶线形,羽状多裂,长 2—3 厘米,顶端急尖,上部叶全缘。总状花序果期伸长;萼片椭圆形,长 1—1.5 毫米,背部有短柔毛;花瓣白色或蔷薇色,长圆状匙形,长 1.5—2 毫米;雄蕊 6。短角果圆卵形或椭圆形,长 4—6 毫米,顶端微缺,基部圆形,边缘有翅,花柱长不超过缺口;果梗较粗,长 2—4 毫米。种子卵形,长约 2.5 毫米,红棕色,近光滑,无边;子叶 3 裂。花期 6—7 月,果期 8—9 月。

产黑龙江、吉林、山东、新疆、西藏,栽培或逸为野生。非洲北部及亚洲西部有分布,传播至欧洲及印度。模式标本采自欧洲。

为新疆民族药,和蚯蚓配合治肠胃病。

组 3. 少蕊组——Sect. **Lepidium**

我国有 13 种(种 3—15)



1—4. 家独行菜 *Lepidium sativum* L.: 1. 全植株, 2. 花, 3. 短角果, 4. 子叶。 5—7. 心叶独行菜 *Lepidium cordatum* Willd.: 5. 花, 果枝, 6. 花, 7. 短角果。 8. 抱茎独行菜 *Lepidium perfoliatum* L.: 8. 全植株。(路桂兰绘)