

毫米,边缘白色膜质,外面疏生柔毛;无花瓣;雄蕊6。短角果卵形,长2.5—3毫米,宽1.5—2毫米,扁平,一面稍凸,有1中脉,顶端微缺,具不明显的窄边,近无花柱;果梗细,长3—4毫米,具棒状腺毛。种子长圆形,长约1.5毫米,棕色。 花果期6—8月。

产内蒙古。生在低山干旱丘陵山坡。模式标本采自内蒙古阿拉善左旗。

和独行菜相似,但植株矮小,叶线形或宽线形,全缘,无花瓣,雄蕊6,二者可以区别。

11. 臭芥属*—— *Coronopus* J. G. Zinn nom. cons.

J. G. Zinn, Catal. Pl. Hort. Acad. Gott. 325. 1757; O. E. Schulz in

Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 17b: 410. 1936; R.

Muschler in Engl. Bot. Jahrb. 41 (3): 11—147. 1908.

一年、二年或多年生草本;茎匍匐或近直立,多分枝,无毛或有单毛,或具乳头状毛。基生叶有长柄,一回或二回羽状分裂;茎生叶有短柄,边缘有锯齿或全缘。花微小,成腋生总状花序;萼片偏斜,短倒卵形或圆形,开展,顶端圆钝;花瓣小,白色,倒卵形或匙形,早落,或无花瓣;雄蕊6,但通常仅有4或2;侧蜜腺钻形或半月形,中蜜腺点状或锥形;子房卵形或近圆形,2裂,有2胚珠,花柱极短,柱头凹陷,稍2裂。短角果成2半球形室,和隔膜成垂直方向压扁,隔膜窄,成熟时分离,每室含1种子;果瓣强韧,近球形,皱缩或网状。种子卵形或半球形;子叶背倚胚根。

10种,近世界广布。我国2种。

本属模式种: *Coronopus ruelli* Allioni (*Cochlearia coronopus* L.)

分 种 检 索 表

- 1. 基生叶和茎中部叶羽状全裂;无花柱或花柱极短;植物具有臭味 1. 臭芥 *C. didymus* (L.) J. E. Smith
- 1. 单叶不裂,全缘,仅少数边缘呈深波状或有少数锯齿;花柱顶端微缺,比花瓣长或近等长;植物无臭味 2. 单叶臭芥 *C. integrifolius* (DC.) Spreng.

1. 臭芥(广州植物志) 臭滨芥(台湾植物志) 图版 11:1—3

Coronopus didymus (L.) J. E. Smith, Fl. Brit. 2:691. 1804; Muschler l. c. 134. 1908; T. Y. Cheo in Bot. Bull. Acad. Sin. 2(3):183. 1948; 广州植物志 117. 1956; 江苏南部种子植物手册 311. 图 493. 1959; Kitamura, Fl. Afghan. 146. 1960; Ball. in T. G. Tutin et al. Fl. Europ. 1: 333. 1964; 中国高等植物图鉴 2: 38. 图 1806. 1972;

* 属的异名: 滨芥属(台湾植物志), 硬果芥属(中国高等植物科属检索表)。