

2. f. 35. 1973.——*Iberidella andersonii* Hook. f. et Thoms. in Journ. Linn. Soc. Bot. **5**: 177. 1861; Hook. f. et T. Anders. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **1**: 163. 1872; Hemsl. et Pea. Journ. Linn. Soc. Bot. **35**: 168. 1902.——*Iberidella tibetica* Marq. et Shaw *ibid.* **48**: 163. 1929. *syn. nov.*

多年生草本；茎平铺或上升，长5—10厘米，稍肉质，无毛。基生叶近莲座状，匙形，长1—3厘米，宽4—12毫米，顶端圆形，基部楔形，边缘稍有锯齿，叶柄长5—10毫米；茎生叶卵状长圆形，长5—10毫米，宽4—8毫米，基部耳状，抱茎。总状花序伞房状，果期伸长达4厘米；花白色或粉红色，直径6—7毫米；花梗长3—4毫米；萼片卵形，长2—2.5毫米；花瓣长圆状倒卵形，长5—6毫米。短角果椭圆状长圆形，长6—8毫米，宽约2毫米，无翅或翅不显著，顶端急尖，全缘；花柱长约1.5毫米。种子椭圆形，长约1毫米。花期6月，果期8月。

产云南(德钦)、西藏。生在山坡石缝中。不丹、克什米尔地区、巴基斯坦均有分布。模式标本采自喜马拉雅山西部。

6. 四川葶苈 图版 16: 6—8

Thlaspi flagelliferum O. E. Schulz in Sitzgsanz Ak. W. 98. 1926; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**(2): 372. 1931.

多年生草本，高6—10厘米；根状茎细长。茎多数，丛生，直立，不分枝，无毛。基生叶莲座状，倒卵形或近圆形，长3—10毫米，宽3—6毫米，顶端圆形，基部楔形，全缘或波状缘，两面无毛，叶柄长5—15毫米；茎生叶卵形，长5—15毫米，宽2—12毫米，顶端急尖，基部抱茎。总状花序伞房状，果期伸长；花白色，直径3—5毫米；花梗长3—5毫米；萼片直立，开展，椭圆形或卵形，长约2毫米，顶端急尖，外面有分叉毛；花瓣倒卵形，长4—5毫米，顶端近圆形。短角果长圆形，长7—9毫米，顶端钝，基部渐狭，无翅，无毛；花柱长约1毫米；果梗开展，长4—6毫米。种子卵形，长约1毫米，棕色。花果期4—5月。

产四川。生在高山草甸，海拔3000米。模式标本采自四川西部。

20. 芥 属——*Capsella* Medic.

Medic. Pflanzengatt. **85**, 99, 1792; Benth. et Hook f. Gen. Pl. **1**:

92. 1862; O. E. Schulz in Engl. et Pflanzenfam. 2 Aufl. **17b**: 453.

1936. *nom. cons.*——*Bursa* Bochner in Ludurg, Def. Gen. Pl. **225**.

1760.

一年或二年生草本；茎直立或近直立，单一或从基部分枝，无毛、具单毛或分叉毛。基生叶莲座状，羽状分裂至全缘，有叶柄；茎上部叶无柄，叶边缘具弯缺牙齿至全缘，基部耳状，抱茎。总状花序伞房状，花疏生，果期延长；花梗丝状，果期上升；萼片近直立，长圆形，

基部不成囊状;花瓣白色或带粉红色,匙形;花丝线形,花药卵形,蜜腺成对,半月形,常有1外生附属物;子房2室,有12—24胚珠,花柱极短。短角果倒三角形或倒心状三角形,扁平,开裂,无翅,无毛,果瓣近顶端最宽,具网状脉,隔膜窄椭圆形,膜质,无脉。种子每室6—12个,椭圆形,棕色;子叶背倚胚根。

约5种,主产地中海地区、欧洲及亚洲西部。其中1种为广布种,我国也产。

本属模式种:芥 *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.

1. 芥(名医别录) 荠菜(通称),菱角菜(广州) 图版14:1—3

***Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.** Pflanzengatt. 1: 85. 1792; T. Y. Cheo in Bot. Bull. Acad. Sin. 2(3): 185. 1949; 广州植物志 116. 图 44. 1956; 江苏南部种子植物手册 312. 图 495. 1959; 北京植物志上册, 346. 图 293. 1962; 中国高等植物图鉴 2: 42. 图 1813. 1972; 秦岭植物志 1(2): 405. 图 348. 1974; 内蒙古植物志 2: 320. 图版 167. 图 1—3. 1978; Kitag. Neo-Linean. Fl. Mansh. 328. 1979; 湖北植物志 2: 32. 图 723. 1979; 东北草本植物志 4: 71. 图版 41. 1980. — *Thlaspi bursa-pastoris* L. Sp. Pl. 647. 1753.

一年或二年生草本,高(7—)10—50厘米,无毛、有单毛或分叉毛;茎直立,单一或从下部分枝。基生叶丛生呈莲座状,大头羽状分裂,长可达12厘米,宽可达2.5厘米,顶裂片卵形至长圆形,长5—30毫米,宽2—20毫米,侧裂片3—8对,长圆形至卵形,长5—15毫米,顶端渐尖,浅裂、或有不规则粗锯齿或近全缘,叶柄长5—40毫米;茎生叶窄披针形或披针形,长5—6.5毫米,宽2—15毫米,基部箭形,抱茎,边缘有缺刻或锯齿。总状花序顶生及腋生,果期延长达20厘米;花梗长3—8毫米;萼片长圆形,长1.5—2毫米;花瓣白色,卵形,长2—3毫米,有短爪。短角果倒三角形或倒心状三角形,长5—8毫米,宽4—7毫米,扁平,无毛,顶端微凹,裂瓣具网脉;花柱长约0.5毫米;果梗长5—15毫米。种子2行,长椭圆形,长约1毫米,浅褐色。 花果期4—6月。

分布几遍全国;全世界温带地区广布。野生,偶有栽培。生在山坡、田边及路旁。模式标本采自欧洲。

全草入药,有利尿、止血、清热、明目、消积功效;茎叶作蔬菜食用;种子含油20—30%,属干性油,供制油漆及肥皂用。

21. 藏芥属——*Hedinia* Ostenf.

Ostenf. in Sven Hedin, Southern Tibet 77. t. 1. f. 2. 1922; O. E.

Schulz in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 17b: 454.

1936; Botsch. in Nov. Syst. Pl. Vasc. 115—121. 1866.

多年生草本;茎匍匐或铺散,多从基部分枝,具灰白色绒毛,为单毛或分叉毛。叶羽状全裂,有多对披针形裂片,基生叶有短柄,上部叶无柄或近无柄。总状花序伞房状,有叶状